



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 04/2022



M0763020N

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

1º TENENTE ENFERMEIRO (QOE) - ENFERMAGEM

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

MANHÃ



Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **oitenta questões objetivas e uma questão discursiva**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato.



Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva.
- ✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, devidamente preenchidos e assinados.



Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.



Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do **Instituto AOC** no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br**, conforme previsto em Edital.



**instituto
aocp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Conhecimentos em Saúde Pública e Gestão de Saúde

1

Sobre a atenção à saúde das pessoas em situações de vulnerabilidades assinale a alternativa correta.

- (A) A atenção à saúde é direcionada aos “grupos de risco” para identificar e atender especificamente homossexuais e usuários de drogas.
- (B) Os atendimentos de saúde às pessoas privadas de liberdade estão restritos ao próprio ambiente prisional para minimizar os riscos de fuga.
- (C) As pessoas privadas de liberdade trabalham auxiliando os profissionais na administração dos medicamentos aos demais privados.
- (D) Residentes em áreas de tráfico de drogas e pobreza possuem maior vulnerabilidade, sendo necessário conhecer os determinantes sociais que influenciam no processo de saúde-doença.
- (E) O conceito de vulnerabilidade é uma condição restrita à renda individual/familiar. Gênero, raça/etnia, apesar de serem relevantes, não estão contemplados no conceito de vulnerabilidade.

2

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado e aperfeiçoar o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Quanto às RAS, é correto afirmar que

- (A) segue a lógica do Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), fundamentado nas ações curativas e centrado no cuidado médico.
- (B) o modelo de atenção preconizado pelas RAS é centrado no atendimento à demanda espontânea e na agudização das condições crônicas.
- (C) a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) está no centro das RAS e por isso é ela que coordena os fluxos e contrafluxos de pacientes pelos demais serviços.
- (D) Rede de Atenção às Urgências e Emergências, Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas e Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência são alguns exemplos das RAS em vigência no SUS.
- (E) a Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada do usuário nos serviços de saúde, mas, por ser de baixa densidade tecnológica, só consegue ser efetiva para 20% das pessoas com condições de saúde simples.

3

Sobre a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990 e o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É objetivo do SUS a identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
 - () É prerrogativa, no campo de atuação do SUS, a colaboração na proteção do meio ambiente.
 - () As iniciativas privadas organizadas para participação complementar ao SUS estão desobrigadas a cumprirem os princípios doutrinários do SUS.
 - () Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa.
- (A) V – V – V – F.
(B) V – V – F – V.
(C) F – V – V – V.
(D) V – F – F – V.
(E) V – V – F – F.

4

Em relação à Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) É o conjunto de ações de saúde coletiva que envolve alta complexidade e tecnologias duras voltadas à promoção, prevenção, diagnóstico e vigilância em saúde.
- (B) É desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado, realizadas preferencialmente por profissionais de saúde de nível superior.
- (C) É a única porta de entrada do SUS, caracterizando-se como coordenadora do cuidado em saúde e definidora das ações e dos serviços a serem executados para o usuário.
- (D) É pautada na acessibilidade e no acolhimento, sendo que as equipes devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram os serviços, de modo universal e sem diferenciações excludentes.
- (E) Apesar de não possuir território adstrito definido, realiza o planejamento e o desenvolvimento de ações de saúde em consonância com o princípio da equidade.

5

A respeito da Portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020, sobre a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Estabelece a notificação compulsória de casos de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados.
- (B) Os tipos de violência (Física / Psicológica ou Moral / Negligência ou Abandono / Sexual / Patrimonial / Tortura / Tráfico de seres humanos / Trabalho infantil) precisam estar descritos na ficha de notificação.
- (C) A Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus é de notificação imediata ao Ministério da Saúde.
- (D) Sobre a notificação para a dengue, os sinais clínicos de alarme e de gravidade precisam estar presentes no preenchimento da ficha de notificação.
- (E) A Hanseníase, por ser uma doença infectocontagiosa de alto potencial transmissor, está inclusa no rol das notificações compulsórias imediatas ao Ministério da Saúde.

6

A Epidemiologia é um ramo da Saúde Pública que se constitui como importante instrumento no desenvolvimento de estratégias para as ações de proteção e promoção da saúde da comunidade. A respeito dos conceitos epidemiológicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pandemia é uma ocorrência epidêmica de larga distribuição espacial que atinge várias nações, tratando-se de um processo limitado no tempo e ilimitado no espaço.
- (B) O surto epidêmico pode ser definido como a ocorrência de uma doença em alta frequência em uma região determinada, como um estado ou região de um país, em que os casos podem estar ou não correlacionados.
- (C) Endemia é a ocorrência de qualquer doença espacialmente localizada, temporalmente ilimitada, habitualmente presente entre os membros de uma população.
- (D) Epidemia é uma alteração espacial e cronologicamente delimitada do estado saúde-doença de uma população, em que há uma elevação inesperada e descontrolada da incidência de determinada doença.
- (E) A ocorrência de uma epidemia pode ser identificada pela análise do diagrama de controle, importante para o acompanhamento e controle das doenças na população.

7

O Cuidado Centrado na Pessoa e Família possui vertentes em diversas políticas e estratégias do Ministério da Saúde, em especial na Política Nacional de Humanização (PNH). Em relação ao Cuidado Centrado na Pessoa e Família, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Explorar a experiência da doença é um momento em que o profissional de saúde precisa repassar com precisão e objetividade o significado daquela doença ao paciente, bem como repassar todas as modificações que ele precisará realizar na sua vida para controlá-la.
- () Para entender a pessoa como um todo, é necessário que o profissional de saúde esteja focado em compreender como aquela condição crônica se instalou, para que possa prescrever o melhor plano de cuidados ao paciente.
- () O fortalecimento da relação entre a pessoa e o profissional de saúde se dá a partir de tratamentos assertivos e resolutivos. Assim, a pessoa consegue ter uma relação de confiança com o profissional.
- () A elaboração do plano conjunto de manejo dos problemas é feito pelo profissional de saúde a partir da identificação dos problemas e seleção das prioridades.

- (A) F – F – F – F.
- (B) V – V – V – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) F – F – F – V.
- (E) V – F – F – F.

8

Considerando a emergência de saúde pública de importância nacional de atenção ao paciente com COVID-19 na Rede de Atenção ao SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) O sistema de informação oficial para o monitoramento de contatos é o sistema SIS-SARS-CoV-2.
- (B) A maioria das pessoas com COVID-19 desenvolveram sintomas graves e com necessidade de suporte de oxigênio, o que provocou o colapso nos serviços hospitalares.
- (C) Os serviços de saúde que compõem a vigilância em saúde têm como finalidade conhecer o perfil epidemiológico dos casos e dos vírus circulantes para que medidas de prevenção e controle sejam traçadas.
- (D) A Vigilância de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) foi implantada no Brasil em 2020, em decorrência da pandemia de COVID-19.
- (E) A Vigilância Sentinela é uma unidade restrita ao Ministério da Saúde implantada para o monitoramento da circulação do vírus SARS-CoV-2 no país.

9

Em relação à Lei nº 8.142/1990, referente à participação popular e controle social, assinale a alternativa correta.

- (A) Os conselheiros de saúde foram instituídos para a participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde, com remuneração *pró-labore por hora/atividade*.
- (B) O Conselho Nacional de Saúde possui composição paritária, ou seja, $\frac{1}{4}$ de usuários, $\frac{1}{4}$ de trabalhadores da saúde, $\frac{1}{4}$ de prestadores de serviços complementares e $\frac{1}{4}$ de gestores.
- (C) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e consultivo para propor diretrizes na formulação de políticas de saúde nos níveis correspondentes.
- (D) Tanto os Conselhos quanto as Conferências de Saúde são condições facultativas para o funcionamento do SUS nas três esferas de governo (municipal, estadual e federal).
- (E) As Conferências buscam consolidar e fortalecer o controle social do SUS, assegurando dotação orçamentária própria, além de reafirmar a participação popular.

10

M.M, 44 anos, sexo masculino, comparece junto com sua esposa à consulta de pré-natal de alto risco no ambulatório de referência para gestação de alto risco no seu município. Diferentemente de sua esposa, M.M não realiza consulta médica há mais de 5 anos, apresenta acúmulo de gordura abdominal evidente e refere que não pratica atividade física. Sobre o caso relatado, assinale a alternativa correta.

- (A) Pensando que a abordagem integral à família é um dos componentes da política de atenção à saúde do homem, o obstetra deve aproveitar esse momento e realizar também o pré-natal do homem.
- (B) A assistência à saúde do homem está intimamente relacionada à mortalidade por câncer de próstata na população dos 20 aos 59 anos. Por isso, o médico deve, pelo menos, solicitar o exame de PSA.
- (C) Diante da urgência da necessidade de consulta médica para o acompanhante, o médico deve encaminhá-lo à Unidade de Pronto Atendimento mais próxima para garantir que esse homem não fique sem atendimento.
- (D) O médico deve orientar o acompanhante a buscar seu atendimento na atenção básica, bem como a realizar exames específicos inseridos na estratégia de pré-natal do parceiro.
- (E) Sabendo que a implementação da atenção à saúde do homem deve ocorrer de forma hierarquizada, priorizando as ações da atenção especializada e hospitalar, esse homem compareceu no nível de atenção correta para realizar também seus exames de rotina.

11

A ferramenta utilizada para o gerenciamento de materiais e estoques dos serviços de saúde, que se baseia na criticidade e imprescindibilidade, é a

- (A) Classificação XYZ.
- (B) Escala de Lawton.
- (C) Classificação RSS.
- (D) Escala de Rass.
- (E) Escala de Braden.

12

Sobre a vigilância em saúde, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

A _____ realiza um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, compreendidas em todas as etapas e processos, da produção ao consumo e descarte.

- (A) Vigilância Sanitária
- (B) Vigilância Epidemiológica
- (C) Vigilância do Trabalho
- (D) Vigilância Ambiental
- (E) Vigilância dos Serviços

13

A Bioética tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente proponíveis e denunciar os riscos das possíveis aplicações. São princípios da bioética, EXCETO

- (A) beneficência.
- (B) não maleficência.
- (C) justiça.
- (D) equidade.
- (E) autonomia.

14

Os indicadores de saúde são medidas que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O cálculo da mortalidade em idosos é realizado a partir do número médio de anos de vida esperados, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- (B) A Pesquisa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) é um importante indicador de qualidade da Atenção Primária.
- (C) O Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP) registra as emergências de saúde pública, por exemplo, a ocorrência de microcefalia.
- (D) O Índice de Massa Corporal (IMC) é um importante indicador nutricional presente no Sistema de Informação Nutricional (SI-Nutri).
- (E) Para a realização da colpocitologia oncótica, emite-se a Autorização para procedimentos de alto custo/complexidade (Apac), a partir do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS).

15

I.G.M, sexo feminino, idosa, 72 anos, comparece à UBS para consulta agendada. Durante a consulta, o profissional de saúde que a atende checa as suas informações na Caderneta de Saúde que ela trouxe consigo, cujo Protocolo de Identificação do Idoso Vulnerável (VES-13) é de 2 pontos. Sobre a atenção à saúde da pessoa idosa no SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) De acordo com o VES-13, a senhora I.G.M é classificada como idosa em risco de fragilização.
- (B) Pela pontuação atingida no VES-13, pode-se afirmar que a senhora I.G.M faz uso de polifarmácia.
- (C) Controle de gastos e gestão das finanças são elementos que fazem parte da avaliação de saúde da pessoa idosa, porém não estão contemplados no VES-13.
- (D) A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é um instrumento de uso restrito da Atenção Primária para o melhor acompanhamento do estado de saúde dos idosos.
- (E) A investigação do humor aparece na Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa como questionamento complementar ao protocolo VES-13.

16

Sobre os processos de trabalho e desenvolvimento dos trabalhadores em serviço ou em formação, assinale a alternativa correta.

- (A) A Educação Permanente em Saúde é um conjunto de práticas educacionais planejadas para o desenvolvimento do profissional a fim de deixá-lo mais capacitado ao trabalho.
- (B) A Educação em Serviço se inicia após a formação básica e está destinada a atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo diante das evoluções técnico-científicas.
- (C) A Educação Continuada é toda ação desenvolvida após a profissionalização com propósito de atualização de conhecimentos por meio de metodologias formais de ensino.
- (D) A Educação em Saúde inclui as experiências vividas do profissional, que o ajudam a aprender as competências importantes ao seu trabalho.
- (E) A Educação Contínua visa desenvolver capacidades cognitivas e psicomotoras no ambiente de trabalho a partir da adesão de metodologias ativas.

17

A respeito do Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC), preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

O PNGC tem como público-alvo, _____, institutos, hospitais federais do Ministério da Saúde e _____. É uma importante ferramenta da gestão de custos pública, com a finalidade de _____ a utilização das informações de custos pelos gestores de saúde, no intuito de otimizar o desempenho do SUS.

- (A) preferencialmente / secretarias estaduais e municipais de saúde / incentivar
- (B) especialmente / secretarias estaduais de saúde / distribuir
- (C) exclusivamente / secretarias municipais de saúde / amplificar
- (D) prioritariamente / ambulatórios de especialidades / expandir
- (E) primeiramente / policlínicas / fomentar

18

Sobre a História Natural das Doenças e seus níveis de prevenção, referente à Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), assinale a alternativa correta.

- (A) A vacinação contra LTA pode ser considerada uma medida de prevenção primária a ser realizada nos serviços públicos de saúde.
- (B) A prescrição do tratamento medicamentoso adequado para o paciente ocorre após a manifestação de sinais e sintomas da LTA, o que corresponde à fase clínica do período patogênico.
- (C) O período pós-patogênico corresponde à eliminação do agente etiológico do organismo do paciente.
- (D) O período de latência da LTA abrange desde a exposição ao agente etiológico até que este se torne infeccioso, incluindo o período pré-patogênico.
- (E) A atuação da enfermagem nos cuidados do curativo diário é uma medida de prevenção primária para LTA.

19

O Planejamento Estratégico em Saúde (PES) é uma metodologia que trabalha com a definição de prioridades definidas por meio da análise situacional, que permite identificar, formular e priorizar os problemas de acordo com as condições de saúde e os aspectos da gestão. Em relação ao PES, assinale a alternativa correta.

- (A) O Momento Explicativo é quando se traçam as metas, prevendo as estratégias e todos os recursos necessários para a implantação do plano.
- (B) O Momento Tático-operacional é quando se pesam prós e contras da implantação do plano, a partir da análise dos recursos utilizados.
- (C) O Momento Estratégico é quando acontece a execução dos trabalhos, na qual as ações são monitoradas e avaliadas continuamente.
- (D) O Momento Reconhecimento corresponde à etapa de diagnóstico, no qual se identificam, selecionam e priorizam os problemas.
- (E) O Momento Normativo é quando ocorre a definição dos objetivos a serem alcançados e se estabelecem os prazos para a realização das tarefas.

20

A matriz SWOT é uma ferramenta amplamente utilizada na gestão em saúde para a organização do planejamento estratégico no ambiente de trabalho. Sobre a ferramenta SWOT, assinale a alternativa correta.

- (A) Como exemplos de fraquezas de um serviço público de saúde, é possível elencar o excesso de burocracia e os problemas de gestão.
- (B) A identificação de oportunidades e fraquezas são fatores de origem externa a serem considerados para a análise de ambiente de trabalho.
- (C) Correlacionar os pontos fortes com as oportunidades permite elaborar estratégias que potencializam a organização do serviço.
- (D) As oportunidades no ambiente de trabalho podem ser exemplificadas como a boa comunicação entre os membros da equipe multidisciplinar.
- (E) As ameaças são atributos negativos internos que comprometem o trabalho. Como exemplo, é possível citar o longo tempo de permanência dos usuários na sala de espera para consulta médica.

21

Está(ão) incluído(s)/a(s) no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- (A) a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde.
- (B) a Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).
- (C) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde.
- (D) as despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (E) os investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e os aprovados pelo Congresso Nacional.

22

Analise o caso a seguir:

A equipe de saúde Vale do Rio Verde promoveu um encontro com a população adscrita presente no território da unidade de saúde. Dentre os assuntos abordados, os direitos e deveres dos usuários foram apresentados pelo gestor de saúde do município. Assinale a alternativa que contempla um desses direitos apresentados.

- (A) Acompanhante, nos casos de internação, para idosos acima de 65 anos.
- (B) Nas situações de urgência/emergência, encaminhamento do paciente ao hospital mais próximo da sua residência.
- (C) Direito da equipe de saúde, preferencialmente o médico, de decidir se os familiares e acompanhantes das pessoas internadas deverão ser informados sobre seu estado de saúde.
- (D) Recebimento das receitas e prescrições terapêuticas devem conter a Classificação Internacional de Doenças.
- (E) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo hábil e em condições seguras, para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema.

23

A taxa de mortalidade infantil, no estado do Espírito Santo, é de 9,76. O método de cálculo utilizado é

- (A) número de óbitos em menores de 1 ano de idade (por 10.000) dividido pelo número de nascidos mortos na população no ano considerado.
- (B) número de óbitos em menores de 5 anos de idade (por 1.000) dividido pelo número de indivíduos que formam a população em determinado momento.
- (C) número de óbitos em menores de 1 ano (por 1.000) dividido pelo número total de óbitos na população no ano considerado.
- (D) número de óbitos em menores de 1 ano (por 120.000) dividido pelo número de indivíduos nascidos vivos na população no ano considerado.
- (E) número de óbitos em menores de 1 ano de idade (por 1.000) dividido pelo número de nascidos vivos na população no ano considerado.

24**Analise o caso a seguir:**

A equipe de Saúde da Família realizou uma reunião para elaborar estratégia de enfrentamento devido à epidemia de dengue no município de Chapecó. Sobre epidemia, é correto afirmar que

- (A) é a denominação utilizada em situações em que a doença envolve grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica.
- (B) é a situação em que há aumento acima do esperado na ocorrência de casos de evento ou doença em uma área ou entre um grupo específico de pessoas, em determinado período.
- (C) é a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada.
- (D) é o caso contraído fora da zona onde se fez o diagnóstico. O emprego dessa expressão dá a ideia de que é possível situar, com certeza, a origem da infecção em uma zona conhecida.
- (E) é a disseminação mundial de uma nova doença, e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, espalha-se por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.

25

Uma criança de 6 anos apresentou sinais e sintomas clínicos compatíveis com sarampo. Teve contato com um primo de 12 anos, que apresentou sintomas da mesma doença, há menos de 21 dias, e teve confirmação de sarampo por diagnóstico laboratorial (esse primo foi considerado a fonte de infecção). Nesse contexto, é mais adequado que essa criança de 6 anos seja classificada como caso

- (A) suspeito.
- (B) confirmado.
- (C) provável ou possível.
- (D) confirmado por critério clínico-epidemiológico.
- (E) coprimário.

Conhecimentos em Enfermagem

26

Em consulta com o Neurologista, uma lactante de 32 anos recebeu a prescrição de Gabapentina, em substituição ao fármaco que usava previamente. Contudo esquece-se de informar ao médico sobre a amamentação e procura o enfermeiro para receber orientações quanto ao uso de Gabapentina na condição de nutriz. Como enfermeiro(a), deve-se orientar a paciente que o medicamento

- (A) tem uso compatível com a amamentação.
- (B) tem uso criterioso durante a amamentação, com raros efeitos adversos no lactente, comumente sonolência.
- (C) tem uso criterioso durante a amamentação, com raros efeitos adversos no lactente, comumente irritabilidade.
- (D) tem uso criterioso durante a amamentação, sendo excretado para o leite materno em pequenas quantidades significativas, com possibilidade de hiperexcitabilidade e sonolência no lactente.
- (E) tem uso incompatível com a amamentação, devendo a lactante retornar ao neurologista para informar sobre a amamentação.

27

Avaliando a rede venosa de um recém-nascido de 2 dias de vida, o enfermeiro decide puncionar a veia que se forma no punho, sobe pelo antebraço e braço, além de chegar à axila, onde termina a partir da fusão com outras veias para formar a veia axilar. Assim, é correto afirmar que a veia de escolha para punção foi a

- (A) mediana.
- (B) cubital.
- (C) cefálica.
- (D) basilíca.
- (E) radial.

28

Uma paciente de 85 anos recebeu diagnóstico de enfermagem de Mobilidade Física Prejudicada (NANDA 2018-2020) em decorrência de sequelas de fratura de quadril. Assim, é correto afirmar que as características definidoras desse diagnóstico de enfermagem incluem:

- (A) apoio ambiental insuficiente; controle muscular diminuído; ansiedade.
- (B) depressão; desnutrição; dor.
- (C) redução na amplitude de movimentos; movimentos lentos; instabilidade postural.
- (D) instabilidade postural; dispneia ao esforço; apoio ambiental insuficiente.
- (E) dor; força muscular diminuída; percentil de índice de massa corporal (IMC) > 75.

29

Para um paciente de 45 anos, portador de Insuficiência Cardíaca Congestiva, o enfermeiro destacou as seguintes características definidoras em seu histórico:

- diminuição da pressão venosa central (PVC);
- edema;
- diminuição da pressão de oclusão da artéria pulmonar (POAP) (pressão capilar);
- fadiga;
- distensão de veia jugular.

Pelos achados, atribuiu o diagnóstico de enfermagem Débito Cardíaco Diminuído por

- (A) frequência cardíaca alterada.
- (B) pré-carga alterada.
- (C) ritmo cardíaco alterado.
- (D) pós-carga alterada.
- (E) contratilidade alterada.

30

Para um adolescente de 15 anos portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), o enfermeiro da unidade estabeleceu o Diagnóstico de Enfermagem “Padrão Respiratório Ineficaz”. Assinale a alternativa que apresenta uma característica definidora pertinente ao diagnóstico.

- (A) Ventilação-minuto aumentada.
- (B) Fase de inspiração prolongada.
- (C) Aumento da pressão inspiratória.
- (D) Diâmetro anteroposterior do tórax diminuído.
- (E) Assumir posição de três pontos.

31

Um paciente hipertenso de 30 anos refere, ao enfermeiro, que faz uso de Propranolol 40 mg uma vez ao dia, mas, por conta do seu uso crônico de cocaína (pelo menos 3x por semana), tem sentido sintomas de aumento da pressão. O enfermeiro deve orientar o paciente que o uso de cocaína e de betabloqueadores

- (A) causa redução da depuração hepática, inibindo a ação do Atenolol.
- (B) leva a arritmias, como bradicardia, depressão sinusal e atrioventricular.
- (C) leva à hipercalemia, causando desconforto. Além disso, deve orientar sobre a dosagem sérica de potássio.
- (D) aumenta o risco de angioedema, levando à dificuldade respiratória e ao cansaço.
- (E) potencializa os efeitos da cocaína.

32

Um paciente de 80 anos internado, sob ventilação mecânica devido a um AVC hemorrágico, com lesão hemisférica bilateral, apresenta, pela avaliação da enfermeira, um padrão respiratório do tipo Cheyne-Stokes. Esse padrão respiratório patológico é identificado por

- (A) oscilação lenta entre a hiperventilação e hipoventilação, intercaladas por períodos de apneia. Após um período de apneia, ocorre um aumento gradual da amplitude do movimento respiratório e hiperventilação (crescente) até atingir um pico, seguido por um período de diminuição da amplitude respiratória e hipoventilação (decrecente).
- (B) padrão irregular da frequência, ritmo e amplitude respiratória. Respirações profundas e superficiais de diferentes amplitudes e ritmos alternam-se ao longo dos ciclos respiratórios, podendo haver inclusão de pausas respiratórias.
- (C) movimentos respiratórios periódicos de amplitude e frequência irregulares intercalados por pausas respiratórias.
- (D) respiração profunda com pausa de 2 a 3 segundos no final da inspiração.
- (E) quadro de hiperventilação rápida e sustentada, em geral com frequência respiratória entre 40 e 70 por minuto.

33

Um senhor de 79 anos está em tratamento com Tadalafila para Hiperplasia Prostática Benigna e chega à unidade com relatos de micções com intervalos menores que o habitual e eliminação de volumes urinários menores que os de hábito. O enfermeiro relata um caso de

- (A) poliúria.
- (B) oligúria.
- (C) anúria.
- (D) disúria.
- (E) polaciúria.

34

Ao exame físico de um recém-nascido do sexo masculino, na avaliação genital, a enfermeira observa localização anômala do meato uretral na face ventral. O achado descrito pela enfermeira é o/a

- (A) hipospádia.
- (B) epispádia.
- (C) escroto bídifo.
- (D) capuchão.
- (E) chordee.

35

Uma paciente em 1º PO de apendicectomia, após o banho, apresentou um episódio de diaforese, com sensação de desmaio e mal-estar. A técnica de enfermagem, ao verificar a PA, indicou à enfermeira um quadro de hipotensão (80x50 mmHg). Prontamente, a enfermeira orientou a técnica a posicionar a paciente em

- (A) Fowler Total.
- (B) Semi-Fowler.
- (C) Decúbito Dorsal.
- (D) Trendelenburg.
- (E) Genupeitoral.

36

Paciente de 38 anos, diabético, veio para coleta de exames de rotina. A solicitação de exame indica hemoglobina glicada e hemograma. O enfermeiro orienta a coletora sobre o uso dos seguintes tubos:

- (A) Flureto de sódio (cinza) e EDTA (roxo).
- (B) Citrato de sódio (cinza) e Heparina (roxo).
- (C) Flureto de sódio (vermelho) e EDTA (azul).
- (D) Citrato de sódio (vermelho) e Heparina (azul).
- (E) Ativador de coágulo jateado (amarelo) e Inibidor glicolítico (verde).

37

Para uma paciente pós-comicial, o médico prescreveu 550 mg de Fenitoína diluída em 150 mL de soro glicosado 5%. Sabendo que a ampola tem apresentação comercial a 2%/5mL, o enfermeiro irá aspirar

- (A) 15,5 mL.
- (B) 27,5 mL.
- (C) 30,0 mL.
- (D) 32,5 mL.
- (E) 35,5 mL.

38

A enfermeira do plantão anterior participou do processo de internação de uma paciente portadora de Transtorno Bipolar tipo I em estado de mania. Em seu registro do histórico de enfermagem, indicou um aspecto global beligerante. Ao assumir o plantão, o enfermeiro entende que a paciente

- (A) tenta ocultar sintomas ou fatos de sua vida com algum intuito.
- (B) tem dificuldade de encerrar a conversa, quer atenção na sua prolixidade.
- (C) atende passiva e imediatamente, sem questionar a todas as solicitações do entrevistador.
- (D) provoca, irrita e parece querer confronto.
- (E) fala e gesticula muito e de forma acelerada.

39

Paciente de 28 anos, portador de esquizofrenia paranoide, chega à unidade apresentando tremor fino e rápido (5 Hz) que envolve os lábios e, eventualmente, a língua. A mãe relata que o paciente tem deixado de tomar a Prometazina junto com o Haloperidol, o que levou ao quadro. Pela avaliação, entendendo que se trata de alteração motora associada aos neurolépticos, o enfermeiro identifica o/a

- (A) Síndrome do coelho.
- (B) Distonia aguda.
- (C) Acatisia.
- (D) Discinesia tardia.
- (E) Parkinsonismo medicamentoso.

40

Considerando o proposto pela Resolução 543/2017, a enfermeira da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é consultada para dimensionar o número de técnicos em enfermagem e de enfermeiros de uma nova UTI cardiológica. Sabendo que o dimensionamento inicial proposto é para 30 funcionários, ela deve basear seu cálculo na seguinte proporção:

- (A) 36% são enfermeiros e os demais, técnicos de enfermagem.
- (B) 42% são enfermeiros e os demais, técnicos de enfermagem.
- (C) 58% são enfermeiros e os demais, técnicos de enfermagem.
- (D) 48% são enfermeiros e os demais, técnicos de enfermagem.
- (E) 52% são enfermeiros e os demais, técnicos de enfermagem.

41

Paciente de 28 anos, moradora de rua, é internada por lesão do cordão posterior da medula ocasionada por neurosífilis, quadro crônico devido a falhas no tratamento por conta do alcoolismo. Durante o exame físico, a enfermeira evidencia a presença de marcha tabética. A respeito da caracterização dessa disbasia, assinale a alternativa correta.

- (A) Ao caminhar, a paciente ziguezagueia.
- (B) A paciente mantém o olhar fixo para o chão, os membros inferiores são levantados abrupta e explosivamente e, ao serem recolocados no chão, os calcanhares tocam o solo pesadamente. O movimento piora com olhos fechados ou torna-se impossível.
- (C) A paciente apresenta lateropulsão quando anda; é como se fosse empurrada para o lado quando tenta se mover em linha reta.
- (D) A paciente tem paralisia do movimento de flexão dorsal do pé e, ao tentar caminhar, toca o solo com a ponta do pé e tropeça.
- (E) A paciente “manca”.

42

Em discussão de caso com a ginecologista de plantão, a enfermeira relata o caso de Roberta, 29 anos, segunda gestação, negra, sobrepeso, que apresenta um quadro de hipertensão (170x110 mmHg), estando na 30ª semana de gestação. A médica, pelos dados, decide prescrever Hidralazina injetável. A enfermeira entende que é a droga preferida para o tratamento agudo da hipertensão arterial grave na gestação, pois

- (A) é um relaxante direto da musculatura arterial lisa.
- (B) é uma benzotiazida, sem efeito diurético, que atua diretamente no capilar arteriolar.
- (C) é uma benzotiazida, com efeito diurético, que atua diminuindo o débito cardíaco.
- (D) é um poderoso vasodilatador tanto para os vasos sanguíneos de resistência como de capacitância.
- (E) assim como os betabloqueadores, tem seu uso indicado para tratamento de manutenção na hipertensão arterial.

43

Para uma puérpera em 1º PO de cesariana que tem apresentado febre, o enfermeiro entende que, pela condição de febre puerperal persistente por antibiótico, são indicados os seguintes testes diagnósticos:

- (A) gráfico de temperatura e leucometria com eosinofilia.
- (B) cultura de secreção endometrial e sangue.
- (C) Sorologia específica e hemograma.
- (D) exame físico, ultrassonografia, aspiração com agulha e exploração cirúrgica.
- (E) US, TC, RM e teste terapêutico com heparina, que são testes predominantemente clínicos.

44

A construção da Escala de Braden é fundamentada na fisiopatologia da lesão por pressão, anteriormente denominada úlcera por pressão. Seus construtos de avaliação envolvem a investigação sobre

- (A) atividades de vida diária; funções sensoriais; uso de dispositivos; nível de consciência; alterações cutâneas.
- (B) atividades de vida diária; funções sensoriais; uso de dispositivos; nutrição; fricção e cisalhamento.
- (C) atividades de vida diária; percepção sensorial; umidade; hábitos funcionais.
- (D) percepção sensorial; umidade; atividade; mobilidade; terapia medicamentosa; uso de dispositivos.
- (E) percepção sensorial; umidade; atividade; mobilidade; nutrição; fricção e cisalhamento.

45

Com base na Resolução COFEN 564/2017, que discorre sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é considerado dever profissional:

- (A) participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar, com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- (B) exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem.
- (C) esclarecer à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de Enfermagem.
- (D) conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e/ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional.
- (E) negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.

46

De acordo com a Resolução COFEN 564/2017, a cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem, que será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. A cassação é determinada pelo Código de Ética Profissional por um período

- (A) indeterminado.
- (B) de até 15 anos.
- (C) de 10 a 25 anos
- (D) de até 30 anos.
- (E) mínimo de 30 anos.

47

A ventilação não invasiva (VNI) pós-extubação é recomendada imediatamente após a extubação nos pacientes de risco para evitar Insuficiência Respiratória Aguda (IRpA) e reintubação como ação

- (A) redutora de taxas de pneumonia.
- (B) profilática.
- (C) redutora de mortalidade.
- (D) curativa.
- (E) facilitadora da retirada da VNI.

48

Das indicações dos modos ventilatórios básicos, são indicações de CPAP:

- (A) EAP cardiogênico no PO de Cirurgia Abdominal e na Apneia do Sono Leve/Moderada.
- (B) Hipercapnias agudas para descanso da musculatura respiratória no EAP cardiogênico e nas infecções de imunossuprimidos.
- (C) Hipercapnias agudas para descanso da musculatura respiratória no EAP cardiogênico e na Apneia do Sono Leve/Moderada.
- (D) EAP cardiogênico no PO de Cirurgia Abdominal e Hipercapnias agudas.
- (E) PO de Cirurgia Abdominal, Hipercapnias agudas e infecções de imunossuprimidos.

49

A dopamina é um importante neurotransmissor do sistema nervoso central e periférico. A ativação dos receptores dopaminérgicos resulta em vasodilatação de artérias renais, mesentéricas, coronárias e cerebrais. Sobre a dopamina, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É precursora endógena da adrenalina, interage, predominantemente, com receptores alfa-adrenérgicos.
- () Pode ser utilizada em baixas doses associada ao uso de dobutamina e/ou noradrenalina no tratamento do choque cardiogênico e do choque séptico com o objetivo de aumentar o fluxo hepático, esplâncnico e renal.
- () Pode ser utilizada em pacientes oligúricos não hipovolêmicos, com o propósito de incremento do fluxo sanguíneo renal e aumento do volume urinário.

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – F.
- (E) F – V – V.

50

De acordo com o Ministério da Saúde, o aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. Permite ainda impacto na promoção da saúde integral da dupla mãe/bebê. De acordo com o documento norteador do Ministério da Saúde sobre o tema, o aleitamento materno pode ser classificado como:

- (A) Predominante, Exclusivo, Complementado, Misto.
- (B) Concomitante, Parcial, Misto ou Parcializado.
- (C) Simples, Completo, Duplo, Partilhado.
- (D) Fracionado, Interrompido, Suplementado, Complementado.
- (E) Estruturado, Artificial, Natural, Observacional, Nutricional, Semi-implementado.

51

Durante a Parada Cardiorrespiratória (PCR), é correto afirmar que, após o primeiro choque, procede-se à Reanimação Cardiopulmonar (RCP) por

- (A) 1 minuto, seguida de checagem de ritmo no monitor.
- (B) 2 minutos, seguida de checagem de ritmo no monitor.
- (C) 4 minutos, seguida de checagem de ritmo no monitor.
- (D) 5 minutos, seguida de checagem de ritmo no monitor.
- (E) 10 minutos, seguida de checagem de ritmo no monitor.

52

O doente portador de Pediculose deve ser mantido em isolamento por, pelo menos, 24 horas ao iniciar o tratamento devido ao alto risco de contaminação e surto na unidade. A Pediculose é causada por um tipo de

- (A) prion.
- (B) ácaro.
- (C) fungo.
- (D) ectoparasita.
- (E) rickettsia.

53

Precauções por aerossóis são indicadas em casos de

- (A) varicela, zoster disseminado, sarampo.
- (B) exantema patequial e febre, doença meningocócica.
- (C) tuberculose pulmonar e laríngea, tosse persistente paroxística.
- (D) zoster disseminado, sarampo, coqueluche, rubéola.
- (E) diarreia aguda e provavelmente infecciosa, rotavirose, meningite asséptica.

54

Dentre as alternativas a seguir, qual indica necessidade de precauções de contato + gotícula?

- (A) Angina de Vicent.
- (B) Adenovírus no lactente.
- (C) Cancro mole (*Chlamydia trachomatis*).
- (D) Celulites infecciosas.
- (E) *Clostridium tetani* (tétano).

55

“São resíduos que apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente, quando não forem submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento e/ou disposição final específicos. Produtos hormonais e antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, digitálicos, imunomoduladores, antirretrovirais, resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria nº 344/98 e suas atualizações.”

Nesse excerto, tem-se a definição de resíduos sólidos de saúde do grupo

- (A) A.
- (B) B.
- (C) C.
- (D) D.
- (E) E.

56

Sobre as recomendações para realização da Cardiotocografia (CTG), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Colocar a gestante em decúbito lateral, posição semideitada (de semi-Fowler = 30° - 35°), em posição de Fowler (45°) ou sentada.
- (B) Evitar período prévio de jejum prolongado.
- (C) Utilizar estimulação vibroacústica em caso de acelerações ausentes.
- (D) A administração de glicose à mãe e o uso de manipulação fetal diminuem os resultados anormais à CTG anteparto.
- (E) Duração média da avaliação: 10 minutos, embora seja exigido tempo adicional de até 30 minutos para que uma anormalidade seja atestada. No caso de dúvidas em relação à interpretação do traçado, aumentar o tempo de observação.

57

Na CTG, a frequência cardíaca fetal basal (FCF) é definida como FCF média calculada em determinado tempo. É anormal a FCF de

- (A) 115 bpm – bradicardia.
- (B) 158 bpm – taquicardia.
- (C) 108 bpm – bradicardia.
- (D) 144 bpm – taquicardia.
- (E) 120 bpm – bradicardia.

58

Em relação à aceleração da FCF à movimentação fetal (AMF) observada na CTG, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. **Todo conceito hígido, quando se movimenta, acelera sua FCF (amplitude > 15 bpm, duração > 15 segundos).**
- II. **Atenção para a utilização do critério de aceleração para fetos prematuros. Para fetos com menos de 32 semanas, a aceleração esperada é de 10 bpm por pelo menos 10 segundos.**
- III. **Ausência de acelerações indica alcalose na maioria dos casos.**

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

59

O polidrâmnio é resultante ou do aumento da produção do líquido amniótico ou da diminuição do seu consumo. O aumento da sua produção é observado, mais comumente, em casos de

- (A) anemia fetal.
- (B) diabetes mellitus materno.
- (C) tumores fetoplacentários.
- (D) transfusão fetofetal.
- (E) malformações fetais, como anencefalia e hérnia diafragmática.

60

O conceito de prevenção é definido como “ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença”. A prevenção apresenta-se em três fases. A prevenção terciária está relacionada ao/à

- (A) promoção à saúde.
- (B) reabilitação.
- (C) proteção específica.
- (D) limitação da invalidez.
- (E) diagnóstico e tratamento precoce.

61

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. No campo da Educação em Saúde, um modelo que se aplica à assistência em saúde é o de Dorothea Orem, que elaborou a teoria do _____. Em sua concepção, o ser humano tem necessidade de se autocuidar e capacidade aprendida para tal, a fim de manter a vida, a saúde e o bem-estar.

- (A) Campo energético
- (B) Movimento social
- (C) Autocuidado
- (D) Bem-estar social
- (E) Cuidado integrativo

62

Em relação à Dengue, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É doença febril aguda caracterizada, em sua forma clássica, por dores musculares e articulares intensas.
- (B) Tem como agente um arbovírus do gênero *Flavivírus* da família *Flaviviridae*, do qual existem quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.
- (C) Somente a espécie de mosquito do gênero *Aedes aegypti* pode servir como transmissor do vírus da dengue.
- (D) A transmissão ocorre quando a fêmea da espécie vetora se contamina ao picar um indivíduo infectado que se encontra na fase virêmica da doença, tornando-se, após um período de 10 a 14 dias, capaz de transmitir o vírus por toda sua vida através de suas picadas.
- (E) As infecções pelo vírus da dengue causam desde a forma clássica (sintomática ou assintomática) até a febre hemorrágica da dengue (FHD).

63

A escala de coma de Jovet é utilizada para avaliação de pacientes com alteração de nível de consciência e estados de coma. V1-V2 são parâmetros associados à

- (A) perceptividade.
- (B) reatividade inespecífica.
- (C) reatividade específica à dor.
- (D) reatividade autonômica.
- (E) recuperação funcional.

64

No gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, a separação dos resíduos no momento e local de sua geração é o processo denominado

- (A) identificação.
- (B) acondicionamento.
- (C) coleta.
- (D) tratamento interno.
- (E) segregação.

65

O tabagismo é o ato de consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que o tabagismo deve ser considerado uma pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada e, como tal, precisa ser combatido. Com base nas informações apresentadas pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O tabagismo é uma doença crônica decorrente da dependência à nicotina, a única substância causadora da adicção.
- (B) Os dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), como o cigarro eletrônico, também têm nicotina, sendo que seu uso foi associado a riscos menores de doenças crônicas, comparados ao cigarro comum.
- (C) Estimativas produzidas por estudos epidemiológicos de coorte indicam que a expectativa de vida média é reduzida em 20 anos em pessoas tabagistas.
- (D) O principal objetivo do programa de tratamento do tabagismo desenvolvido nas unidades de saúde é a abstinência tabágica (que inclui a cessação do tabagismo e a prevenção de recaída), por meio de intervenções cognitivas, treinamento de habilidades comportamentais e tratamento farmacológico (exceto situações especiais).
- (E) O cigarro convencional contém milhares de substâncias químicas, sendo a nicotina fator de risco para múltiplas doenças graves, como doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas e diversas neoplasias, dentre outras.

66

Em determinados trabalhadores, a leptospirose pode ser considerada doença relacionada ao trabalho, do Grupo II da Classificação de Schilling, uma vez que as circunstâncias ocupacionais da exposição à *Leptospira* podem ser consideradas contribuintes, no conjunto de fatores associados à etiologia dessa doença infecciosa. De acordo com o Ministério da Saúde, a leptospirose relacionada ao trabalho

- (A) tem sido descrita em trabalhadores que exercem atividades em zonas endêmicas, em trabalhos de saúde pública e em laboratórios de pesquisa, entre outras atividades em que a exposição ocupacional pode ser identificada.
- (B) é relativamente comum na exposição ocupacional e dá-se, principalmente, em acidentes de trabalho (agricultura, construção civil, mineração, saneamento e coleta de lixo) ou em acidentes de trajeto.
- (C) tem sido descrita em trabalhadores de granjas e criadores de aves (patos, gansos, periquitos, pombos etc.), empregados de casas de comércio desses animais, veterinários, guardas florestais e outros em que se confirmem as circunstâncias de exposição ocupacional.
- (D) tem sido identificada em abatedouros, frigoríficos, na manipulação de carne ou de produtos derivados, ordenha e fabricação de laticínios e em atividades assemelhadas.
- (E) tem sido descrita em trabalhadores que exercem atividades em contato direto com águas contaminadas ou em locais com dejetos de animais portadores de germes, como nos trabalhos efetuados dentro de minas, túneis, galerias e esgoto; em cursos d'água e drenagem; em contato com roedores e com animais domésticos; na preparação de alimentos de origem animal, de peixes, de laticínios e em outras atividades assemelhadas.

67

Em relação aos requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Pré-limpeza envolve remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana presente nos produtos para saúde, utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica (manual ou automatizada), atuando em superfícies internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o produto seguro para manuseio e preparado para desinfecção ou esterilização.
- (B) Produtos para saúde semicríticos são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas.
- (C) Produtos para saúde críticos de conformação complexa são produtos para saúde que possuem lúmen inferior a cinco milímetros ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas.
- (D) A sala de desinfecção química deve conter bancada com uma cuba para limpeza e uma cuba para enxágue com profundidade e dimensionamento que não permitam a imersão completa do produto ou equipamento.
- (E) Para produtos para saúde cujo lúmen tenha diâmetro externo superior a cinco milímetros, é obrigatório que a fase automatizada da limpeza seja feita em lavadora ultrassônica com conector para canulados e que utilize tecnologia de fluxo intermitente.

68

Em relação à classificação das vacinas segundo o tipo de antígenos, *Haemophilus influenzae* tipo B, *Pneumococo* e *Meningococo* são descritas como

- (A) agentes inativados.
- (B) vetores virais (recombinantes).
- (C) fracionadas de base proteica (subunidades).
- (D) fracionadas de base polissacarídica.
- (E) agentes vivos atenuadas.

69

Em relação à vacina contra Hepatite A, assinale a alternativa correta.

- (A) Dosagem e via de administração: 0,5 ml por via intramuscular profunda.
- (B) Apresentação: forma liofilizada, multidoses e acompanhada do respectivo diluente.
- (C) Para indivíduos de 12 meses a 29 anos de idade, administrar 2 (duas) doses, conforme situação vacinal encontrada.
- (D) Administrar a 1ª dose aos 12 meses de idade e a 2ª dose a partir de 15 meses de idade.
- (E) Local de aplicação: região posterior do braço ou tríceps braquial direito.

70

Agir educativo, segundo documentos do Ministério da Saúde, é

- (A) ação social que se alimenta do processo de construção de um substrato teórico-metodológico de sustentação, de projetos políticos que suscitem a participação da sociedade e de ações capazes de produzirem novos sentidos nas relações entre necessidades de saúde da população e organização do cuidado da saúde.
- (B) um paradigma que ganhou visibilidade com a Carta de Ottawa, ao defender que a melhoria da qualidade de vida é "resultante de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, comportamentais e, também, biológicos."
- (C) a mobilização que ocorre quando um grupo de pessoas, uma comunidade ou uma sociedade decide e age com objetivo comum, buscando, quotidianamente, os resultados desejados por todos.
- (D) estratégia de reestruturação dos serviços a partir da análise dos determinantes sociais e econômicos, mas sobretudo de valores e conceitos dos profissionais.
- (E) voltar-se para a promoção da participação social no processo de formulação e gestão da política de saúde, direcionando-se para o cumprimento efetivo dos princípios ético-políticos do SUS: universalidade, integralidade, equidade, descentralização, participação e controle social.

71

De acordo com a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, compete, privativamente, ao Enfermeiro:

- (A) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.
- (B) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
- (C) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- (D) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem.
- (E) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.

72

A doença hemolítica perinatal (DHPN) é caracterizada pela ação de anticorpos maternos contra antígenos de grupo sanguíneo de origem paterna, presentes nas células fetais ou do recém-nascido (RN). É correto afirmar que são capazes de atravessar a placenta e, portanto, causar anemia, hidropsia ou morte fetal somente os anticorpos da classe

- (A) IgM.
- (B) IgD.
- (C) IgG.
- (D) IgA
- (E) IgE.

73

Menopausa espontânea é conceituada como

- (A) parada da menstruação imediata causada por intervenção médica (quimioterapia ou terapia de irradiação pélvica) ou intervenção cirúrgica.
- (B) elenco de sintomas e sinais que podem ocorrer no climatério.
- (C) fase referente à transição do período reprodutivo para o período não reprodutivo feminino.
- (D) menopausa que ocorre sem intervenção cirúrgica ou medicamentosa.
- (E) diagnóstico retrospectivo, sendo o último sangramento seguido de 12 meses de amenorria.

74

Na Reanimação Cardiopulmonar (RCP), os aspectos principais a serem observados nas compressões são: frequência, profundidade, retorno do tórax a cada compressão e interrupção mínima. Sobre as compressões torácicas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Para maximizar a perfusão, recomenda-se que as pausas das compressões torácicas sejam minimizadas, a fim de que a Fração de Compressões Torácicas (FCT) seja de, pelo menos, 50% e, idealmente, de 70%.
- II. É necessário colocar a região hipotenar de uma mão sobre a metade superior do esterno da vítima e a outra mão sobre a primeira, entrelaçando-a.
- III. As compressões torácicas devem ser na frequência de 100-120 compressões/ minuto.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I.
- (E) I, II e III.

75

Das causas de hipocalcemia associadas aos fármacos, o deslocamento de Potássio Transcelular pode estar associado a

- (A) diuréticos.
- (B) mineralocorticoides.
- (C) glicocorticoides altas doses.
- (D) agentes tocolíticos.
- (E) aminoglicosídeos.

76

Hipernatremia por perda de água para dentro das células ocorre em casos de

- (A) anemia das células falciformes.
- (B) infecções respiratórias e queimaduras.
- (C) exercício intenso, convulsões e rabdomiólise.
- (D) diabetes insípida nefrogênica.
- (E) alimentação entérica hipertônica, enemas ou eméticos hipertônicos.

77

Sobre os sinais semiológicos de abdome agudo inflamatório, como em apendicites, o sinal de Dunphy é descrito como

- (A) diminuição global dos RHA.
- (B) dor abdominal ao tossir.
- (C) timpanismo em região hepática.
- (D) posição antálgica (flexão do joelho contra o quadril).
- (E) compressão retrógrada em flanco esquerdo com dor em FID.

78

No abdome agudo perfurativo, ar fora da alça, demarcando seus limites, caracteriza o sinal semiológico de

- (A) Rovsing.
- (B) Murphy.
- (C) Ridler.
- (D) Joubert.
- (E) Fox.

79

Sobre a ruptura traumática de diafragma, assinale a alternativa correta.

- (A) É mais comumente diagnosticada à esquerda.
- (B) O trauma penetrante produz rupturas radiais grandes que levam à herniação.
- (C) O trauma contuso produz perfurações pequenas que levam algum tempo, às vezes anos, para resultar em hérnias diafragmáticas.
- (D) Se houver suspeita de ruptura de hemidiafragma direito, deve-se passar uma sonda nasogástrica. Se a sonda aparecer na cavidade torácica ao Rx simples de tórax, está feito o diagnóstico. Caso a radiografia inicial não faça o diagnóstico, deve-se injetar contraste e verificar se há passagem para a cavidade torácica.
- (E) A ruptura do hemidiafragma esquerdo raramente é diagnosticada no período pós-traumático imediato. Frequentemente, é descoberta durante uma intervenção motivada por outra lesão abdominal e deve ser tratada através de sutura primária.

80

VDRL é a sigla usada para *Venereal Disease Research Laboratory* que, em tradução literal para o português, é o Estudo Laboratorial de Doenças Venéreas. O método é usado para identificar pacientes portadores da Sífilis, uma doença sexualmente transmissível causada pela bactéria

- (A) *Escherichia coli*.
- (B) *Haemophilus ducreyi*.
- (C) *Bordetella pertussis*.
- (D) *Shigella flexneri*.
- (E) *Treponema Pallidum*.

Instruções para Discursiva

A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria.
2. Atendimento ao tema proposto na questão.
3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão.
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado;
- b) manuscrito em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
- c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e) não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva ou entregá-la em branco;
- f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

O candidato disporá de, **no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas** para elaborar a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

Discursiva

1

As diversas definições de determinantes sociais de saúde (DSS) expressam, com maior ou menor nível de detalhe, o conceito bastante generalizado de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas à sua situação de saúde. O modelo de Dahlgren e Whitehead inclui os DSS dispostos em diferentes camadas concêntricas, segundo seu nível de abrangência. Já as Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente. Os objetivos das RAS são melhorar a qualidade da atenção, a qualidade de vida das pessoas usuárias, os resultados sanitários do sistema de atenção à saúde, a eficiência na utilização dos recursos e a equidade em saúde.

Diante do exposto, explique:

- a) com base no modelo dos Determinantes Sociais de Saúde (DSS) de Dahlgren e Whitehead, que sustenta a atual política de atenção às pessoas com condições crônicas no SUS, como os determinantes individuais e proximais são considerados nesse modelo;
- b) os três elementos fundamentais constitutivos das Redes de Atenção à Saúde.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
