



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 04/2022



M0749009N

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

## 1º TENENTE MÉDICO (QOM) - PSIQUIATRIA

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

**SUPERIOR**

Turno

**MANHÃ**



### Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **oitenta questões objetivas e uma questão discursiva**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato.



### Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva.
- ✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, devidamente preenchidos e assinados.



### Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.



### Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br**, conforme previsto em Edital.



**instituto  
aocp**

Fraudar ou tentar fraudar  
Concursos Públicos é Crime!  
Previsto no art. 311 - A do  
Código Penal

## Conhecimentos em Saúde Pública e Gestão de Saúde

1

**Sobre a atenção à saúde das pessoas em situações de vulnerabilidades assinale a alternativa correta.**

- (A) A atenção à saúde é direcionada aos “grupos de risco” para identificar e atender especificamente homossexuais e usuários de drogas.
- (B) Os atendimentos de saúde às pessoas privadas de liberdade estão restritos ao próprio ambiente prisional para minimizar os riscos de fuga.
- (C) As pessoas privadas de liberdade trabalham auxiliando os profissionais na administração dos medicamentos aos demais privados.
- (D) Residentes em áreas de tráfico de drogas e pobreza possuem maior vulnerabilidade, sendo necessário conhecer os determinantes sociais que influenciam no processo de saúde-doença.
- (E) O conceito de vulnerabilidade é uma condição restrita à renda individual/familiar. Gênero, raça/etnia, apesar de serem relevantes, não estão contemplados no conceito de vulnerabilidade.

2

**As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado e aperfeiçoar o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Quanto às RAS, é correto afirmar que**

- (A) segue a lógica do Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), fundamentado nas ações curativas e centrado no cuidado médico.
- (B) o modelo de atenção preconizado pelas RAS é centrado no atendimento à demanda espontânea e na agudização das condições crônicas.
- (C) a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) está no centro das RAS e por isso é ela que coordena os fluxos e contrafluxos de pacientes pelos demais serviços.
- (D) Rede de Atenção às Urgências e Emergências, Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas e Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência são alguns exemplos das RAS em vigência no SUS.
- (E) a Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada do usuário nos serviços de saúde, mas, por ser de baixa densidade tecnológica, só consegue ser efetiva para 20% das pessoas com condições de saúde simples.

3

**Sobre a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990 e o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) É objetivo do SUS a identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
  - ( ) É prerrogativa, no campo de atuação do SUS, a colaboração na proteção do meio ambiente.
  - ( ) As iniciativas privadas organizadas para participação complementar ao SUS estão desobrigadas a cumprirem os princípios doutrinários do SUS.
  - ( ) Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa.
- (A) V – V – V – F.
  - (B) V – V – F – V.
  - (C) F – V – V – V.
  - (D) V – F – F – V.
  - (E) V – V – F – F.

4

**Em relação à Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa correta.**

- (A) É o conjunto de ações de saúde coletiva que envolve alta complexidade e tecnologias duras voltadas à promoção, prevenção, diagnóstico e vigilância em saúde.
- (B) É desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado, realizadas preferencialmente por profissionais de saúde de nível superior.
- (C) É a única porta de entrada do SUS, caracterizando-se como coordenadora do cuidado em saúde e definidora das ações e dos serviços a serem executados para o usuário.
- (D) É pautada na acessibilidade e no acolhimento, sendo que as equipes devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram os serviços, de modo universal e sem diferenciações excludentes.
- (E) Apesar de não possuir território adstrito definido, realiza o planejamento e o desenvolvimento de ações de saúde em consonância com o princípio da equidade.

5

**A respeito da Portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020, sobre a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Estabelece a notificação compulsória de casos de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados.
- (B) Os tipos de violência (Física / Psicológica ou Moral / Negligência ou Abandono / Sexual / Patrimonial / Tortura / Tráfico de seres humanos / Trabalho infantil) precisam estar descritos na ficha de notificação.
- (C) A Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus é de notificação imediata ao Ministério da Saúde.
- (D) Sobre a notificação para a dengue, os sinais clínicos de alarme e de gravidade precisam estar presentes no preenchimento da ficha de notificação.
- (E) A Hanseníase, por ser uma doença infectocontagiosa de alto potencial transmissor, está incluída no rol das notificações compulsórias imediatas ao Ministério da Saúde.

6

**A Epidemiologia é um ramo da Saúde Pública que se constitui como importante instrumento no desenvolvimento de estratégias para as ações de proteção e promoção da saúde da comunidade. A respeito dos conceitos epidemiológicos, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Pandemia é uma ocorrência epidêmica de larga distribuição espacial que atinge várias nações, tratando-se de um processo limitado no tempo e ilimitado no espaço.
- (B) O surto epidêmico pode ser definido como a ocorrência de uma doença em alta frequência em uma região determinada, como um estado ou região de um país, em que os casos podem estar ou não correlacionados.
- (C) Endemia é a ocorrência de qualquer doença espacialmente localizada, temporalmente ilimitada, habitualmente presente entre os membros de uma população.
- (D) Epidemia é uma alteração espacial e cronologicamente delimitada do estado saúde-doença de uma população, em que há uma elevação inesperada e descontrolada da incidência de determinada doença.
- (E) A ocorrência de uma epidemia pode ser identificada pela análise do diagrama de controle, importante para o acompanhamento e controle das doenças na população.

7

**O Cuidado Centrado na Pessoa e Família possui vertentes em diversas políticas e estratégias do Ministério da Saúde, em especial na Política Nacional de Humanização (PNH). Em relação ao Cuidado Centrado na Pessoa e Família, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) Explorar a experiência da doença é um momento em que o profissional de saúde precisa repassar com precisão e objetividade o significado daquela doença ao paciente, bem como repassar todas as modificações que ele precisará realizar na sua vida para controlá-la.
- ( ) Para entender a pessoa como um todo, é necessário que o profissional de saúde esteja focado em compreender como aquela condição crônica se instalou, para que possa prescrever o melhor plano de cuidados ao paciente.
- ( ) O fortalecimento da relação entre a pessoa e o profissional de saúde se dá a partir de tratamentos assertivos e resolutivos. Assim, a pessoa consegue ter uma relação de confiança com o profissional.
- ( ) A elaboração do plano conjunto de manejo dos problemas é feito pelo profissional de saúde a partir da identificação dos problemas e seleção das prioridades.

- (A) F – F – F – F.
- (B) V – V – V – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) F – F – F – V.
- (E) V – F – F – F.

**8**

**Considerando a emergência de saúde pública de importância nacional de atenção ao paciente com COVID-19 na Rede de Atenção ao SUS, assinale a alternativa correta.**

- (A) O sistema de informação oficial para o monitoramento de contatos é o sistema SIS-SARS-CoV-2.
- (B) A maioria das pessoas com COVID-19 desenvolveram sintomas graves e com necessidade de suporte de oxigênio, o que provocou o colapso nos serviços hospitalares.
- (C) Os serviços de saúde que compõem a vigilância em saúde têm como finalidade conhecer o perfil epidemiológico dos casos e dos vírus circulantes para que medidas de prevenção e controle sejam traçadas.
- (D) A Vigilância de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) foi implantada no Brasil em 2020, em decorrência da pandemia de COVID-19.
- (E) A Vigilância Sentinela é uma unidade restrita ao Ministério da Saúde implantada para o monitoramento da circulação do vírus SARS-CoV-2 no país.

**9**

**Em relação à Lei nº 8.142/1990, referente à participação popular e controle social, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os conselheiros de saúde foram instituídos para a participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde, com remuneração *pró-labore por hora/atividade*.
- (B) O Conselho Nacional de Saúde possui composição paritária, ou seja,  $\frac{1}{4}$  de usuários,  $\frac{1}{4}$  de trabalhadores da saúde,  $\frac{1}{4}$  de prestadores de serviços complementares e  $\frac{1}{4}$  de gestores.
- (C) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e consultivo para propor diretrizes na formulação de políticas de saúde nos níveis correspondentes.
- (D) Tanto os Conselhos quanto as Conferências de Saúde são condições facultativas para o funcionamento do SUS nas três esferas de governo (municipal, estadual e federal).
- (E) As Conferências buscam consolidar e fortalecer o controle social do SUS, assegurando dotação orçamentária própria, além de reafirmar a participação popular.

**10**

**M.M, 44 anos, sexo masculino, comparece junto com sua esposa à consulta de pré-natal de alto risco no ambulatório de referência para gestação de alto risco no seu município. Diferentemente de sua esposa, M.M não realiza consulta médica há mais de 5 anos, apresenta acúmulo de gordura abdominal evidente e refere que não pratica atividade física. Sobre o caso relatado, assinale a alternativa correta.**

- (A) Pensando que a abordagem integral à família é um dos componentes da política de atenção à saúde do homem, o obstetra deve aproveitar esse momento e realizar também o pré-natal do homem.
- (B) A assistência à saúde do homem está intimamente relacionada à mortalidade por câncer de próstata na população dos 20 aos 59 anos. Por isso, o médico deve, pelo menos, solicitar o exame de PSA.
- (C) Diante da urgência da necessidade de consulta médica para o acompanhante, o médico deve encaminhá-lo à Unidade de Pronto Atendimento mais próxima para garantir que esse homem não fique sem atendimento.
- (D) O médico deve orientar o acompanhante a buscar seu atendimento na atenção básica, bem como a realizar exames específicos inseridos na estratégia de pré-natal do parceiro.
- (E) Sabendo que a implementação da atenção à saúde do homem deve ocorrer de forma hierarquizada, priorizando as ações da atenção especializada e hospitalar, esse homem compareceu no nível de atenção correta para realizar também seus exames de rotina.

**11**

**A ferramenta utilizada para o gerenciamento de materiais e estoques dos serviços de saúde, que se baseia na criticidade e imprescindibilidade, é a**

- (A) Classificação XYZ.
- (B) Escala de Lawton.
- (C) Classificação RSS.
- (D) Escala de Rass.
- (E) Escala de Braden.

12

Sobre a vigilância em saúde, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

A \_\_\_\_\_ realiza um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, compreendidas em todas as etapas e processos, da produção ao consumo e descarte.

- (A) Vigilância Sanitária
- (B) Vigilância Epidemiológica
- (C) Vigilância do Trabalho
- (D) Vigilância Ambiental
- (E) Vigilância dos Serviços

13

A Bioética tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente proponíveis e denunciar os riscos das possíveis aplicações. São princípios da bioética, EXCETO

- (A) beneficência.
- (B) não maleficência.
- (C) justiça.
- (D) equidade.
- (E) autonomia.

14

Os indicadores de saúde são medidas que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O cálculo da mortalidade em idosos é realizado a partir do número médio de anos de vida esperados, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- (B) A Pesquisa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) é um importante indicador de qualidade da Atenção Primária.
- (C) O Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP) registra as emergências de saúde pública, por exemplo, a ocorrência de microcefalia.
- (D) O Índice de Massa Corporal (IMC) é um importante indicador nutricional presente no Sistema de Informação Nutricional (SI-Nutri).
- (E) Para a realização da colpocitologia oncótica, emite-se a Autorização para procedimentos de alto custo/complexidade (Apac), a partir do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS).

15

I.G.M, sexo feminino, idosa, 72 anos, comparece à UBS para consulta agendada. Durante a consulta, o profissional de saúde que a atende checa as suas informações na Caderneta de Saúde que ela trouxe consigo, cujo Protocolo de Identificação do Idoso Vulnerável (VES-13) é de 2 pontos. Sobre a atenção à saúde da pessoa idosa no SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) De acordo com o VES-13, a senhora I.G.M é classificada como idosa em risco de fragilização.
- (B) Pela pontuação atingida no VES-13, pode-se afirmar que a senhora I.G.M faz uso de polifarmácia.
- (C) Controle de gastos e gestão das finanças são elementos que fazem parte da avaliação de saúde da pessoa idosa, porém não estão contemplados no VES-13.
- (D) A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é um instrumento de uso restrito da Atenção Primária para o melhor acompanhamento do estado de saúde dos idosos.
- (E) A investigação do humor aparece na Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa como questionamento complementar ao protocolo VES-13.

16

**Sobre os processos de trabalho e desenvolvimento dos trabalhadores em serviço ou em formação, assinale a alternativa correta.**

- (A) A Educação Permanente em Saúde é um conjunto de práticas educacionais planejadas para o desenvolvimento do profissional a fim de deixá-lo mais capacitado ao trabalho.
- (B) A Educação em Serviço se inicia após a formação básica e está destinada a atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo diante das evoluções técnico-científicas.
- (C) A Educação Continuada é toda ação desenvolvida após a profissionalização com propósito de atualização de conhecimentos por meio de metodologias formais de ensino.
- (D) A Educação em Saúde inclui as experiências vividas do profissional, que o ajudam a aprender as competências importantes ao seu trabalho.
- (E) A Educação Contínua visa desenvolver capacidades cognitivas e psicomotoras no ambiente de trabalho a partir da adesão de metodologias ativas.

17

**A respeito do Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC), preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.**

**O PNGC tem como público-alvo, \_\_\_\_\_, institutos, hospitais federais do Ministério da Saúde e \_\_\_\_\_. É uma importante ferramenta da gestão de custos pública, com a finalidade de \_\_\_\_\_ a utilização das informações de custos pelos gestores de saúde, no intuito de otimizar o desempenho do SUS.**

- (A) preferencialmente / secretarias estaduais e municipais de saúde / incentivar
- (B) especialmente / secretarias estaduais de saúde / distribuir
- (C) exclusivamente / secretarias municipais de saúde / amplificar
- (D) prioritariamente / ambulatórios de especialidades / expandir
- (E) primeiramente / policlínicas / fomentar

18

**Sobre a História Natural das Doenças e seus níveis de prevenção, referente à Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), assinale a alternativa correta.**

- (A) A vacinação contra LTA pode ser considerada uma medida de prevenção primária a ser realizada nos serviços públicos de saúde.
- (B) A prescrição do tratamento medicamentoso adequado para o paciente ocorre após a manifestação de sinais e sintomas da LTA, o que corresponde à fase clínica do período patogênico.
- (C) O período pós-patogênico corresponde à eliminação do agente etiológico do organismo do paciente.
- (D) O período de latência da LTA abrange desde a exposição ao agente etiológico até que este se torne infeccioso, incluindo o período pré-patogênico.
- (E) A atuação da enfermagem nos cuidados do curativo diário é uma medida de prevenção primária para LTA.

19

**O Planejamento Estratégico em Saúde (PES) é uma metodologia que trabalha com a definição de prioridades definidas por meio da análise situacional, que permite identificar, formular e priorizar os problemas de acordo com as condições de saúde e os aspectos da gestão. Em relação ao PES, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Momento Explicativo é quando se traçam as metas, prevendo as estratégias e todos os recursos necessários para a implantação do plano.
- (B) O Momento Tático-operacional é quando se pesam prós e contras da implantação do plano, a partir da análise dos recursos utilizados.
- (C) O Momento Estratégico é quando acontece a execução dos trabalhos, na qual as ações são monitoradas e avaliadas continuamente.
- (D) O Momento Reconhecimento corresponde à etapa de diagnóstico, no qual se identificam, selecionam e priorizam os problemas.
- (E) O Momento Normativo é quando ocorre a definição dos objetivos a serem alcançados e se estabelecem os prazos para a realização das tarefas.

**20**

A matriz SWOT é uma ferramenta amplamente utilizada na gestão em saúde para a organização do planejamento estratégico no ambiente de trabalho. Sobre a ferramenta SWOT, assinale a alternativa correta.

- (A) Como exemplos de fraquezas de um serviço público de saúde, é possível elencar o excesso de burocracia e os problemas de gestão.
- (B) A identificação de oportunidades e fraquezas são fatores de origem externa a serem considerados para a análise de ambiente de trabalho.
- (C) Correlacionar os pontos fortes com as oportunidades permite elaborar estratégias que potencializam a organização do serviço.
- (D) As oportunidades no ambiente de trabalho podem ser exemplificadas como a boa comunicação entre os membros da equipe multidisciplinar.
- (E) As ameaças são atributos negativos internos que comprometem o trabalho. Como exemplo, é possível citar o longo tempo de permanência dos usuários na sala de espera para consulta médica.

**21**

**Está(ão) incluído(s)/a(s) no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):**

- (A) a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde.
- (B) a Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).
- (C) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde.
- (D) as despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (E) os investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e os aprovados pelo Congresso Nacional.

**22**

**Analise o caso a seguir:**

A equipe de saúde Vale do Rio Verde promoveu um encontro com a população adscrita presente no território da unidade de saúde. Dentre os assuntos abordados, os direitos e deveres dos usuários foram apresentados pelo gestor de saúde do município. Assinale a alternativa que contempla um desses direitos apresentados.

- (A) Acompanhante, nos casos de internação, para idosos acima de 65 anos.
- (B) Nas situações de urgência/emergência, encaminhamento do paciente ao hospital mais próximo da sua residência.
- (C) Direito da equipe de saúde, preferencialmente o médico, de decidir se os familiares e acompanhantes das pessoas internadas deverão ser informados sobre seu estado de saúde.
- (D) Recebimento das receitas e prescrições terapêuticas devem conter a Classificação Internacional de Doenças.
- (E) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo hábil e em condições seguras, para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema.

**23**

**A taxa de mortalidade infantil, no estado do Espírito Santo, é de 9,76. O método de cálculo utilizado é**

- (A) número de óbitos em menores de 1 ano de idade (por 10.000) dividido pelo número de nascidos mortos na população no ano considerado.
- (B) número de óbitos em menores de 5 anos de idade (por 1.000) dividido pelo número de indivíduos que formam a população em determinado momento.
- (C) número de óbitos em menores de 1 ano (por 1.000) dividido pelo número total de óbitos na população no ano considerado.
- (D) número de óbitos em menores de 1 ano (por 120.000) dividido pelo número de indivíduos nascidos vivos na população no ano considerado.
- (E) número de óbitos em menores de 1 ano de idade (por 1.000) dividido pelo número de nascidos vivos na população no ano considerado.

24

Analise o caso a seguir:

A equipe de Saúde da Família realizou uma reunião para elaborar estratégia de enfrentamento devido à epidemia de dengue no município de Chapecó. Sobre epidemia, é correto afirmar que

- (A) é a denominação utilizada em situações em que a doença envolve grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica.
- (B) é a situação em que há aumento acima do esperado na ocorrência de casos de evento ou doença em uma área ou entre um grupo específico de pessoas, em determinado período.
- (C) é a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada.
- (D) é o caso contraído fora da zona onde se fez o diagnóstico. O emprego dessa expressão dá a ideia de que é possível situar, com certeza, a origem da infecção em uma zona conhecida.
- (E) é a disseminação mundial de uma nova doença, e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, espalha-se por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.

25

Uma criança de 6 anos apresentou sinais e sintomas clínicos compatíveis com sarampo. Teve contato com um primo de 12 anos, que apresentou sintomas da mesma doença, há menos de 21 dias, e teve confirmação de sarampo por diagnóstico laboratorial (esse primo foi considerado a fonte de infecção). Nesse contexto, é mais adequado que essa criança de 6 anos seja classificada como caso

- (A) suspeito.
- (B) confirmado.
- (C) provável ou possível.
- (D) confirmado por critério clínico-epidemiológico.
- (E) coprimário.

## Conhecimentos em Medicina

26

Um paciente de 55 anos possui um sopro, percebido na ausculta cardíaca pelo seu médico. Foi realizada a manobra de Rivero-Carvallo nesse paciente e ela foi positiva. Qual é o provável diagnóstico desse paciente?

- (A) Estenose mitral.
- (B) Estenose tricúspide.
- (C) Insuficiência pulmonar.
- (D) Insuficiência tricúspide.
- (E) Insuficiência mitral.

27

Sobre a febre reumática, é correto afirmar que

- (A) é uma doença autoimune geralmente desencadeada pelo *Staphylococcus*.
- (B) o diagnóstico clínico geralmente é realizado empregando-se os critérios de Ranson.
- (C) a artrite constitui o componente mais importante e grave da doença.
- (D) é uma doença de herança autossômica dominante.
- (E) pode desencadear cardite grave e insuficiência cardíaca congestiva.

28

Assinale a alternativa correta a respeito da insuficiência cardíaca (IC) e seus mecanismos envolvidos.

- (A) A diminuição do débito cardíaco gera um aumento da angiotensina II, acarretando diminuição da resistência periférica e da pré-carga.
- (B) Na IC, geralmente há uma diminuição na concentração de endotelina, sendo um fator de bom prognóstico.
- (C) Edema de membros inferiores e hepatomegalia dolorosa são sinais geralmente encontrados na IC direita.
- (D) Na IC retrógrada, predominam manifestações de pós-carga aumentada, como hipotensão arterial e queda do débito urinário.
- (E) Na IC, o nível do fator de necrose tumoral diminui, induzindo disfunção miocárdica associada à apoptose.

**29**

**Assinale a alternativa que apresenta manifestações extra-articulares que mais comumente podem estar presentes na artrite reumatoide.**

- (A) Nódulos subcutâneos, cavitações pulmonares e espessamento vesical.
- (B) Ceratoconjuntivite seca, pericardite e nódulos subcutâneos.
- (C) Fibrose intersticial difusa, neuropatia compressiva e litíase biliar.
- (D) Vasculite, hepatomegalia e pancreatite.
- (E) Nódulos musculares, pericardite e miopatia degenerativa.

**30**

**Um paciente de 66 anos, sexo masculino, apresenta febre recorrente, fraqueza e indisposição. Em seu hemograma, foi identificada anemia, leucocitose de 70.000 céls./mm<sup>3</sup>, presença de blastos e de bastonetes de Auer. Qual é o provável diagnóstico desse paciente?**

- (A) Leucemia mieloide aguda.
- (B) Linfoma não-Hodgkin.
- (C) Leucemia mieloide crônica.
- (D) Linfoma Hodgkin.
- (E) Leucemia linfocítica aguda.

**31**

**Quanto às patologias relacionadas à próstata e sua anatomia, é correto afirmar que**

- (A) a maioria dos adenocarcinomas de próstata surgem na zona de transição.
- (B) a hiperplasia prostática benigna surge exclusivamente na zona periférica.
- (C) a zona de transição corresponde a aproximadamente 70% do volume da próstata no adulto jovem e é o local de surgimento da hiperplasia prostática benigna.
- (D) a maioria dos adenocarcinomas de próstata surgem na zona periférica.
- (E) a hiperplasia prostática benigna surge exclusivamente na zona central.

**32**

**Assinale a alternativa que apresenta apenas manifestações clínicas comumente relacionadas à Doença de Graves.**

- (A) Depressão, palpitações e pele seca.
- (B) Oftalmopatia, bócio e sonolência.
- (C) Queda de cabelo, mixedema pré-tibial e proptose ocular.
- (D) Fadiga, bócio e litíase biliar.
- (E) Artropatia, perda de peso e diplopia.

**33**

**Sobre as medicações relacionadas ao tratamento da asma brônquica, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O brometo de ipratrópio é uma droga anticolinérgica utilizada como agente broncodilatador.
- (B) O formoterol é um beta-agonista inalatório de longa duração.
- (C) As xantinas são drogas com moderada ação broncodilatadora e com alguma ação anti-inflamatória.
- (D) O nedocromil tem sua ação antiasmática relacionada à inibição de canais de cloro.
- (E) Os antileucotrienos, como o montelucaste, são utilizados principalmente pela via endovenosa no tratamento agudo da asma.

**34**

**Um paciente de 42 anos, sem comorbidades ou vícios, apresenta dispneia, tosse e dor torácica, de início há 2 semanas. Apresentou derrame pleural ao exame de imagem e foi submetido à toracocentese diagnóstica, constatando-se líquido pleural exsudativo, com infiltrado linfomonocitário e nível de adenosina deaminase de 100UI. Qual é o diagnóstico mais provável desse paciente?**

- (A) Carcinoma pulmonar de células não pequenas.
- (B) Pneumonia bacteriana complicada.
- (C) Pneumonia viral complicada.
- (D) Tuberculose pleural.
- (E) Insuficiência cardíaca complicada.

**35**

Uma paciente de 40 anos, portadora de Lúpus, apresenta alterações renais com presença de depósitos globais subepiteliais com alterações mesangiais, compatível com glomerulonefrite lúpica membranosa, que, segundo a Sociedade Internacional de Nefrologia e Patologia Renal, é descrita como nefrite lúpica classe

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

**36**

Assinale a alternativa que apresenta corretamente um fármaco utilizado no tratamento da osteoporose e seu modo de ação.

- (A) Ranelato de estrôncio – atua estimulando a formação óssea, provavelmente agindo nos canais de potássio e acelerando a apoptose dos osteoblastos.
- (B) Denosumab – anticorpo monoclonal humano antiRANKL que mimetiza a atuação da osteoprotegerina endógena, ao ocupar RANKL nos osteoblastos, evitando a ativação de osteoclastos.
- (C) Teriparatida – atua aumentando a apoptose e estimulando a atividade dos osteoclastos, aumentando, também, a massa óssea.
- (D) Raloxifeno – modulador seletivo de receptores estrogênicos que exerce efeito antagonista no metabolismo lipídico e ósseo, e agonista no tecido mamário.
- (E) Bisfosfonatos – inibem a reabsorção óssea através do aumento da osteoclastogênese e da atividade dos osteoclastos, acelerando, também, sua apoptose.

**37**

Um paciente de 28 anos, sem comorbidades, começou a apresentar febre de 40°C, prostração, coriza, tosse e conjuntivite nos últimos 2 dias. Apresentou, a seguir, lesões elevadas esbranquiçadas com base eritematosa na região interna das bochechas e, após 2 dias, rash cutâneo em face, com disseminação posterior para membros inferiores, com duração de 5 dias. Esse quadro clínico está, mais provavelmente, relacionado ao/à

- (A) rubéola.
- (B) exantema súbito.
- (C) sarampo.
- (D) eritema infeccioso.
- (E) dengue.

**38**

Um paciente de 82 anos, hipertenso e diabético, iniciou quadro de dor abdominal, perda de peso e icterícia significativa. Realizou tomografia de abdome total com achado de massa na cabeça do pâncreas em contato com a veia mesentérica superior e com a veia porta em aproximadamente 270°, além de 2 nódulos hepáticos, o maior tendo 3 cm. Diante do caso clínico desse paciente e seus achados, qual das condutas a seguir é a menos indicada em seu processo de manejo?

- (A) Gastroduodenopancreatectomia com ressecção das lesões hepáticas.
- (B) Derivação biliodigestiva em Y-de-Roux.
- (C) Biópsia pancreática por ecoendoscopia e passagem de prótese de via biliar via CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica).
- (D) Tomografias de tórax e solicitação de Ca 19-9 para melhor estadiamento de provável neoplasia pancreática.
- (E) Biópsia percutânea das lesões hepáticas guiada por tomografia.

**39**

Paciente jovem com ganho de peso há 1 ano e diagnóstico de osteoartrose de quadril à direita de início recente. Qual deve ser o primeiro tratamento a ser indicado para esse paciente?

- (A) Cirúrgico, com artrodese de quadril.
- (B) Cirúrgico, com osteotomia de fêmur proximal.
- (C) Conservador, com perda de peso e realização de exercícios sem carga.
- (D) Cirúrgico, com osteoplastia de quadril.
- (E) Cirúrgico, com artroplastia total de quadril.

**40**

**Assinale a alternativa que apresenta apenas informações corretas relacionadas à indicação de abordagem cirúrgica no paciente com aneurisma de aorta abdominal.**

- (A) Aneurismas maiores que 3cm, geralmente, têm indicação cirúrgica.
- (B) Crescimento do aneurisma de 0,2cm ao ano, geralmente, tem indicação cirúrgica.
- (C) Aneurismas maiores que 10cm têm indicação cirúrgica. De tamanho inferior a esse, geralmente, não têm indicação cirúrgica.
- (D) Aneurismas maiores que 6cm, geralmente, têm indicação cirúrgica.
- (E) Crescimento do aneurisma de 0,6cm ao longo de três anos, geralmente, tem indicação cirúrgica.

**41**

**Um paciente de 67 anos apresenta edema e dor à palpação de região poplíteia de membro inferior direito associados à taquicardia (frequência cardíaca = 110bpm). Realizou uma cirurgia ortopédica há 2 semanas. Começou a apresentar febre e tosse há poucas horas. De acordo com o Escore de Wells, qual é o grau de probabilidade para diagnóstico de TEP (tromboembolismo pulmonar) para esse paciente?**

- (A) Probabilidade baixa.
- (B) Probabilidade alta.
- (C) Probabilidade muito baixa.
- (D) Probabilidade muito alta.
- (E) Probabilidade moderada.

**42**

**Dentre os tipos de demência, é possível citar a demência frontotemporal (DFT) e a demência relacionada à doença de Alzheimer. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma alteração encontrada mais comumente na doença de Alzheimer em relação à DFT.**

- (A) Síndrome amnésica tardia.
- (B) Alteração de personalidade precoce.
- (C) Anomia precoce.
- (D) Estereotípias verbais.
- (E) Distúrbios visuoespaciais tardios.

**43**

**No tratamento do diabetes mellitus, é possível lançar mão dos análogos do peptídio semelhante ao glucagon 1 (GLP1, *glucagon-like peptide 1*). Qual das medicações a seguir faz parte dessa classe de medicamentos?**

- (A) Acarbose.
- (B) Exenatida.
- (C) Metformina.
- (D) Pioglitazona.
- (E) Repaglinida.

**44**

**Em relação à dengue, sua apresentação e seu manejo, é correto afirmar que**

- (A) os sinais de alerta e agravamento do quadro costumam ocorrer na fase de remissão da febre.
- (B) a prova do laço positiva é patognomônica de febre hemorrágica da dengue.
- (C) o ácido mefenâmico não deve ser utilizado no controle da dor, pois pode aumentar o risco de sangramentos.
- (D) os salicilatos podem ser empregados para controle da febre e da dor em associação com a dipirona.
- (E) o diagnóstico sorológico pode ser feito pelo método ELISA, devendo ser coletado a partir do segundo dia do início dos sintomas.

**45**

**Assinale a alternativa correspondente à causa menos comum, dentre as outras, de hemorragia digestiva alta.**

- (A) Úlcera duodenal.
- (B) Varizes esofágicas.
- (C) Úlcera gástrica.
- (D) Tumores de esôfago.
- (E) Gastrites e duodenites.

**46****Em relação aos tumores que podem acometer o fígado, é correto afirmar que**

- (A) o adenoma hepático é um tumor benigno raro, encontrado predominantemente em homens jovens.
- (B) os hemangiomas são tumores benignos, geralmente assintomáticos, encontrados incidentalmente em exames de imagem.
- (C) a hiperplasia nodular focal é o tumor benigno mais comum do fígado, encontrado predominantemente em mulheres jovens.
- (D) o carcinoma hepatocelular é o tumor maligno primário mais frequente do fígado, com acometimento predominante em mulheres.
- (E) os adenomas hepáticos maiores do que 1cm devem ser removidos cirurgicamente devido ao alto de risco de malignidade.

**47****Um paciente com choque hipovolêmico grave encontra-se na tríade letal. Quais sinais a seguir incluem o paciente nesse estado?**

- (A) Alcalose, hipertermia e trombose venosa profunda.
- (B) Hipotermia, alcalose e coagulopatia.
- (C) Acidose, hipertermia e taquicardia.
- (D) Coagulopatia, hipotermia e hipotensão.
- (E) Acidose, hipotermia e coagulopatia.

**48****São manifestações extraintestinais que podem ocorrer na doença de Crohn, EXCETO**

- (A) uveíte.
- (B) pioderma gangrenoso.
- (C) hipotireoidismo.
- (D) amiloidose.
- (E) espondilite anquilosante.

**49****Como se denomina o sinal correspondente à dor no ponto de McBurney quando o abdome inferior esquerdo é comprimido?**

- (A) Sinal de McBurney.
- (B) Sinal de Rovsing.
- (C) Sinal de Murphy.
- (D) Sinal do obturador.
- (E) Sinal do ileopsoas.

**50****Quanto aos critérios de Ranson para pancreatite aguda biliar no momento de admissão do paciente, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) os descritos a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) Idade maior que 55 anos.
- ( ) Nível de lactato desidrogenase >250UI/L.
- ( ) Nível de glicose no sangue > 200mg/dL.
- ( ) Aspartato aminotransferase >250UI/L.

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – V – F – V.

## Conhecimentos Específicos

51

Quanto à síndrome serotoninérgica, assinale a alternativa correta.

- (A) Ocorre mais frequentemente em pacientes adolescentes e adultos jovens.
- (B) Tem como sintomas principais hipotonia, hiponatremia e insuficiência hepática.
- (C) Ocorre exclusivamente com o uso de inibidores da recaptação de serotonina.
- (D) Pode ocorrer com o uso de qualquer droga de ação serotoninérgica havendo maior risco de associações medicamentosas.
- (E) O manejo clínico é sempre ambulatorial por não haver riscos de complicações.

52

Em relação ao transtorno de personalidade antissocial, é correto afirmar que

- (A) é a consequência de cerca de 50% dos casos de TDAH não tratados na infância.
- (B) algumas vezes é precedido por transtorno de conduta, sendo mais comum no sexo feminino.
- (C) é caracterizado por falta de empatia, baixa tolerância à frustração e tendência a comportamentos violentos.
- (D) esquizofrenia e transtorno bipolar são comorbidades comuns que corroboram o diagnóstico.
- (E) o tratamento medicamentoso é bastante eficaz e reduz a necessidade de terapia.

53

Em relação às alucinações, é correto afirmar que

- (A) a alucinação cenestésica é um tipo de alucinação combinada de modalidades sensoriais.
- (B) a síndrome de Cotard é um tipo de alucinação cinestésica comum nos quadros demenciais.
- (C) as alucinações hipnopômicas ocorrem quando o indivíduo está adormecendo e devem ser tratadas, pois são patológicas.
- (D) a Síndrome de Ekbom é um delírio de infestação comumente associado a alucinações táteis.
- (E) as alucinações áudio-verbais são patognômicas da esquizofrenia e geralmente são congruentes com o humor.

54

Luisa, 22 anos, estudante de engenharia, chega ao consultório referindo instabilidade de humor desde os 15 anos, com crises de ansiedade recorrentes, alguns episódios de automutilação nos braços e ideação suicida nas últimas semanas após término de relacionamento. Considerando as informações apresentadas, qual seria a conduta mais adequada nessa situação?

- (A) Investigar os riscos associados à ideação suicida, como planejamento, acesso a meios letais, uso de substâncias e rede de apoio, e iniciar tratamento do transtorno mental.
- (B) Fazer psicoeducação sobre Transtorno de Personalidade Borderline e iniciar estabilizador de humor.
- (C) Chamar um familiar responsável e encaminhar a paciente para internação psiquiátrica.
- (D) Prescrever antidepressivo tricíclico e encaminhar para psicoterapia.
- (E) Prescrever antidepressivo dual, antipsicótico, benzodiazepínico e convocar familiar para orientações de proteção.

55

José, 36 anos, auxiliar administrativo, relata que começou a beber diariamente no último ano após divórcio. Percebe que isso está prejudicando seu desempenho no trabalho, pois está mais desatento e fica ansioso para ir embora e beber. Fala que se envolveu em algumas brigas em bar durante intoxicação alcoólica e conta que seu pai era etilista e agressivo. Em relação ao diagnóstico do transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool e ao tratamento desse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de uso nocivo e o paciente deve ser encaminhado para terapia de grupo.
- (B) Trata-se de síndrome de abstinência e o paciente deve ser encaminhado para emergência.
- (C) Trata-se de síndrome de abstinência e devem ser pedidos exames e prescrito benzodiazepínico.
- (D) Trata-se de uso nocivo e a conduta deve ser medicamentosa e psicoterápica.
- (E) Trata-se de Síndrome de Dependência e a conduta deve ser solicitação de exames laboratoriais, encaminhamento psicoterápico e medicamentos.

**56**

Eliane, 39 anos, do lar, relata que se sente constantemente irritada e ansiosa nos últimos anos, tem a sensação de que o pensamento está acelerado e fica fisicamente cansada, mas com dificuldade para dormir. Conta que sente muita culpa por perder a paciência com os filhos, mas nega tristeza, agressividade ou ideia suicida. Sobre esse caso, assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica e o tratamento mais adequado.

- (A) Transtorno Bipolar; exames laboratoriais e estabilizadores de humor, como Lítio e Indutor do Sono.
- (B) Transtorno Depressivo Leve; ISRS, benzodiazepínico e psicoterapia.
- (C) Transtorno de Ansiedade Generalizada; exames laboratoriais, psicoterapia e ISRS.
- (D) Transtorno de Personalidade Borderline; exames gerais, terapia DBT e ISRS.
- (E) Transtorno Disfórico Pré-Menstrual; exames laboratoriais, terapia hormonal e encaminhamento para ginecologista.

**57**

Em relação ao pensamento e suas alterações, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O bloqueio ou interceptação de pensamento ocorre quase exclusivamente na Esquizofrenia.
- (B) O pensamento desagregado é característico dos pródromos de esquizofrenia.
- (C) A lentificação do pensamento ocorre principalmente na depressão grave e na intoxicação por sedativos.
- (D) O pensamento obsessivo geralmente tem conteúdo absurdo ou repulsivo e gera angústia.
- (E) A aceleração do pensamento é mais comum nos quadros de mania, ansiedade intensa e nas psicoses tóxicas.

**58**

Susana, 28 anos, guarda municipal, relata que, no período pré-menstrual, sente labilidade afetiva e raiva acentuadas, que interferem em suas relações afetivas e em seu trabalho, já tendo sido advertida por agressão verbal. Refere que os sintomas acontecem quase todos os meses desde a menarca e que também ocorre falta de energia, aumento do apetite e insônia. Faz uso de anticoncepcional oral e melatonina. Sobre esse caso, assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica e a conduta mais adequada.

- (A) Transtorno Bipolar; exames laboratoriais e antipsicótico para controle da agressividade.
- (B) Transtorno Depressivo; ISRS e indutor de sono.
- (C) Transtorno Disfórico Pré-Menstrual; exames laboratoriais e ISRS.
- (D) Transtorno de Ansiedade Generalizada; terapia comportamental e ISRS.
- (E) Transtorno de Personalidade Borderline; terapia comportamental e estabilizador de humor.

**59**

Sobre a Deficiência Intelectual ou Retardo Mental, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico baseia-se tanto em avaliação clínica quanto em testes padronizados das funções adaptativas e intelectuais.
- (B) A aplicação do WISC ou do WAIS são suficientes para o diagnóstico e a especificação do quadro.
- (C) A aplicação do WISC e do WAIS foi progressivamente sendo substituída pela avaliação genética.
- (D) Algumas síndromes genéticas já pressupõem a deficiência intelectual, e a intervenção precoce pode reverter o diagnóstico.
- (E) A prevalência, na população geral, é de cerca de 5%. As formas mais graves geralmente acometem o sexo feminino.

**60**

Bruna, 44 anos, sofreu abuso sexual há 6 semanas quando voltava a pé do trabalho. Relata que tem tido pesadelos angustiantes com o abuso e, às vezes, sente o cheiro do abusador, mas não se lembra do rosto dele. Ao longo dos dias, costuma ter crises em que se sente presa e com muito medo. Relata que não consegue mais voltar sozinha do trabalho, afastou-se do namorado e sente culpa e vergonha pelo que aconteceu. Considerando as informações apresentadas, qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Transtorno de Estresse Agudo.
- (B) Transtorno de Estresse Pós-Traumático.
- (C) Transtorno Dissociativo.
- (D) Transtorno Depressivo.
- (E) Transtorno de Ansiedade.

**61**

**Em relação aos transtornos da alimentação, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O Transtorno Alimentar Restritivo/Evitativo pode cursar com perda de peso e interferir no funcionamento psicossocial.
- (B) A Anorexia Nervosa se caracteriza por peso abaixo do normal ou esperado para idade e pode causar compulsão alimentar purgativa.
- (C) Na Bulimia Nervosa, os comportamentos purgatórios são geralmente precedidos por compulsão alimentar e, em casos extremos, podem ocorrer mais de 14 episódios por semana.
- (D) No Transtorno de Compulsão Alimentar, os episódios de compulsão geram sofrimento marcante e não estão associados a comportamentos compensatórios inapropriados.
- (E) Na Síndrome do Comer Noturno, o indivíduo geralmente não se lembra do episódio e, na maioria das vezes, está associado a efeitos colaterais de medicações.

**62**

Rafael, 33 anos, advogado, relata que tem dificuldade de se organizar e cumprir os prazos dos processos, tendo muitos prejuízos em seu trabalho. Descreve que sempre postergou suas tarefas e que, quando era criança, levava muita bronca por se agitado, quebrou o braço uma vez e repetiu de ano duas vezes. Queixa-se que está sempre atrasado, já teve que refazer a cópia da chave de casa muitas vezes e que não consegue terminar de ler um livro. Sobre o provável diagnóstico do caso apresentado, é correto afirmar que

- (A) não existem estudos suficientes que comprovem sua herdabilidade.
- (B) a dopamina e a noradrenalina não estão envolvidas na neurobiologia desse quadro.
- (C) déficits cognitivos, como disfunção executiva e alteração no sistema de recompensa, são raros nesses casos.
- (D) o tratamento medicamentoso ajusta os níveis de dopamina e norepinefrina, que modulam e corrigem as transmissões glutamatérgicas.
- (E) o tratamento medicamentoso consiste em ajustar os níveis de serotonina e dopamina no sistema gabaérgico.

**63**

**Em relação às medicações antipsicóticas (AP), assinale a alternativa correta.**

- (A) A ação terapêutica de AP convencionais se deve ao bloqueio dos receptores D2 na via dopaminérgica mesolímbica.
- (B) Menos de 1% dos pacientes em uso crônico de AP desenvolve discinesia tardia.
- (C) Sintomas extrapiramidais e hiperprolactinemia estão associados ao bloqueio na mesma via dopaminérgica.
- (D) Os AP atípicos não têm ação sobre outros sistemas neurotransmissores.
- (E) Os AP que têm efeito antagonístico de H1 e de 5HT2C podem diminuir o apetite.

**64**

**Qual das seguintes medicações NÃO é uma medicação de escolha para tratamento de Fibromialgia?**

- (A) Duloxetina.
- (B) Quetiapina.
- (C) Pregabalina.
- (D) Desvenlafaxina.
- (E) Gabapentina.

65

Gabriela, 33 anos, está no segundo mês do puerpério e amamentando em livre demanda. Queixa-se que tem tido choro fácil, tristeza, irritabilidade, sentimento de culpa, perda de apetite e insônia há 4 semanas, com piora progressiva. Nega ideação suicida e refere bom vínculo com o bebê. Considerando as informações apresentadas, qual é a melhor opção de prescrição medicamentosa para esse caso?

- (A) Amitriptilina.
- (B) Fluoxetina.
- (C) Sertralina.
- (D) Diazepam.
- (E) Aripiprazol.

66

Sobre as Parassonias, é correto afirmar que

- (A) terror noturno e sonambulismo só ocorrem em crianças.
- (B) medicações sedativas são o tratamento de escolha para esses casos.
- (C) epilepsia é um possível diagnóstico diferencial.
- (D) no terror noturno, a pessoa acorda após um grito e tem dificuldade de voltar a dormir por medo da lembrança do sonho.
- (E) no sonambulismo, o indivíduo geralmente se comunica com outras pessoas e tende a ocorrer mais no fim da noite.

67

Helena, 23 anos, estudante de medicina, queixa-se de sensação de desconforto nas pernas que se inicia no repouso e melhora com movimento. Relata que esses sintomas atrapalham o início do sono e que tem tido sonolência diurna. Relaciona começo do quadro com colocação do DIU e aumento do fluxo menstrual há 6 meses. Considerando o quadro descrito, é correto afirmar que

- (A) exames laboratoriais com hemograma e ferritina devem ser solicitados como primeira conduta.
- (B) a reposição de ferro provavelmente não melhoraria o quadro por ser uma condição genética.
- (C) alterações no exame físico, como sensibilidade à palpação, são comuns.
- (D) as câimbras geralmente melhoram com orientações posturais e nutricionais.
- (E) a Síndrome das Pernas Inquietas é uma condição rara em mulheres e não há alteração na polissonografia.

68

Em relação ao gene MTHFR, assinale a alternativa correta.

- (A) Evidências sugerem que os polimorfismos de SNPs – MTHFR 677C>T não têm relação com Transtorno Depressivo.
- (B) Evidências sugerem que os polimorfismos de SNPs - MTHFR 1298 A>C não têm relação com Transtorno Depressivo.
- (C) Os polimorfismos de MTHFR podem estar ausentes, presentes em heterozigose ou em homozigose e a epistasia contribui para a atividade enzimática.
- (D) A epistasia não se aplica ao gene MTHFR e sua possível relação com o Transtorno Depressivo.
- (E) A prescrição de L-metilfolato é contraindicada em casos de variantes que diminuem a ação da enzima metilenoetetrahidrofolato redutase.

69

João, 57 anos, dá entrada no serviço de emergência, trazido por vizinhos, com quadro de agitação psicomotora intensa e agressividade. Há 2 dias, o paciente está fazendo barulhos de madrugada, xingando e ameaçando pessoas na rua. Vizinhos relatam que João faz tratamento no CAPS, mas não sabem diagnóstico nem medicações em uso. Assinale a alternativa INCORRETA para o manejo emergencial desse quadro após ser feita a avaliação da condição médica geral.

- (A) Avaliar sinais de intoxicação e abstinência, fazer intervenções ambientais e avaliar cooperação para decidir via de administração medicamentosa.
- (B) Caso o paciente esteja cooperativo, prescrever Haldol e Diazepam intramuscular com contenção mecânica.
- (C) Caso o paciente esteja colaborativo, prescrever medicamento oral, monitorar, complementar a avaliação e planejar o tratamento específico.
- (D) Se o paciente não estiver cooperativo, prescrever medicação parenteral com contenção física, monitoramento e complementação da avaliação.
- (E) Medidas não coercitivas, como intervenções ambientais e comportamentais, devem ser tomadas sempre como primeira opção.

70

Antônio, 75 anos, apresenta quadro depressivo grave com piora progressiva há 2 anos. Faz uso de Fluoxetina 60 mg ao dia há 3 meses, queixa-se de náuseas, dor de cabeça e sonolência. Refere ter tomado Amitriptilina e Escitalopran anteriormente, sem resposta. Antônio também toma diversas medicações para controle de DM2 e Dislipidemia. Considerando o caso descrito, assinale a alternativa correta.

- (A) Eletroconvulsoterapia está contraindicada nesse caso pela idade do paciente.
- (B) A dose da Fluoxetina deve ser aumentada para 80 mg.
- (C) As queixas do paciente devem ser investigadas por meio de exames gerais, com dosagem de sódio pelo risco de Hiponatremia.
- (D) A medicação deve ser potencializada com Mirtazapina 30 mg ou Quetiapina 100 mg.
- (E) A medicação deve ser potencializada com Diazepan 5 mg ou Clonazepan 0,5 mg.

71

Renata, 29 anos, faz tratamento por Transtorno Bipolar há 10 anos. Assintomática, em uso de Carbonato de Lítio 900 mg ao dia, realizou última litemia há 2 meses: 0,9. Conta que teve uma infecção intestinal com diarreia aguda há 4 dias, tomou antibióticos e anti-inflamatório. Chega ao pronto atendimento desidratada, com tremor grosseiro e letargia. Considerando o quadro apresentado, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Deve-se investigar intoxicação por Lítio e fazer hidratação endovenosa com urgência.
- (B) A evolução desse quadro pode cursar com disartria, hipertonia e convulsões.
- (C) A evolução desse quadro pode cursar com choque cardiogênico e insuficiência renal aguda.
- (D) A Litemia da paciente era recente e estava boa, portanto a intoxicação por Lítio está descartada.
- (E) O tratamento desse caso consiste na administração de fluidos endovenosos e descontaminação gastrointestinal.

72

Sobre as Síndromes Psicorgânicas, é correto afirmar que

- (A) a ocorrência de alterações mentais em um indivíduo sem psicopatologia prévia e sem evidente fator psicogênico é indicativo de etiologia orgânica.
- (B) alterações de consciência, de memória, de atenção e alucinações visuais não são compatíveis com etiologia orgânica.
- (C) sintomas neurológicos lateralizados (como hemiparesia) ou bilaterais (como sinal de Babinski) descartam etiologia orgânica.
- (D) o exame físico-neurológico com história detalhada, exame de motricidade, sensibilidade e campos visuais são de difícil realização e não precisam ser feitos na rotina da avaliação.
- (E) os exames complementares, como testes laboratoriais e tomografia computadorizada, não contribuem para elucidação diagnóstica.

73

Sobre interações medicamentosas de psicofármacos, assinale a alternativa correta.

- (A) Associação de psicotrópicos com propriedades sedativas ou anticolinérgicas não costuma ter relação causal com *delirium*.
- (B) Arritmias cardíacas por prolongamento do intervalo QT podem ser prevenidas com polifarmácia psicotrópica.
- (C) Fluoxetina e Paroxetina induzem uma ou mais enzimas CYP450.
- (D) Fluvoxamina e Duloxetina inibem uma ou mais enzimas CYP450.
- (E) Carbamazepina e Valproato inibem uma ou mais enzimas CYP450.

**74****Assinale a alternativa correta.**

- (A) A dependência química deve ser comprovada de forma inequívoca, com exame complementar, para fins periciais.
- (B) O perito deve avaliar a capacidade de entendimento e de determinação do dependente químico em relação ao delito.
- (C) Na psiquiatria forense, a dependência química é classificada como perturbação da saúde mental e, portanto, é mais grave do que a doença mental propriamente dita.
- (D) A Lei nº 11.343/2006, conhecida como nova lei antidrogas, classifica como traficantes os dependentes ou usuários e suspende as penas alternativas como medidas educativas.
- (E) A Lei nº 11.343/2006, conhecida como nova lei antidrogas, cria a prisão em flagrante para usuários de drogas.

**75**

**Lucas, 23 anos, relata que faz uso de cocaína há 4 anos, desde que iniciou faculdade de direito. No início, usava apenas em festas, mas, no último ano, tem intensificado o uso e refere precisar da droga para sair de casa de manhã. Avalia que tem tido grandes prejuízos econômicos e sociais. Em relação ao tratamento multimodal mais adequado para Lucas, é correto afirmar que**

- (A) o tratamento de escolha inicial é Naltrexona e Diazepam.
- (B) o tratamento com Clonazepan e terapia psicodinâmica tem maior chance de sucesso.
- (C) a internação psiquiátrica deve ser a primeira opção para prevenção de recaídas.
- (D) a prescrição de Risperidona associada à psicanálise tem robusta evidência científica.
- (E) o tratamento inicial com Topiramato e intervenção psicossocial pode ser uma boa opção inicial.

**76**

**Qual das alternativas a seguir NÃO é uma terapia biológica de neuromodulação em psiquiatria?**

- (A) Estimulação Magnética Transcraniana.
- (B) Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua.
- (C) Eletroconvulsoterapia.
- (D) Estimulação Cerebral Profunda.
- (E) Hipnoterapia.

**77**

**Assinale a alternativa correta a respeito da Esquizofrenia.**

- (A) A expectativa de vida é reduzida em razão das condições médicas associadas.
- (B) A prevalência de Esquizofrenia ao longo da vida é de 5%.
- (C) Os sintomas costumam aparecer na primeira década de vida.
- (D) O risco de suicídio é baixo.
- (E) Comorbidades são raras, sendo a mais comum depressão.

**78**

**Qual das seguintes alternativas NÃO é um possível diagnóstico diferencial de Fobia Social ou Transtorno de Ansiedade Social?**

- (A) Mutismo Seletivo.
- (B) Transtorno do Espectro Autista.
- (C) Transtorno de Ansiedade Generalizada.
- (D) Transtorno de Pânico.
- (E) Transtorno Obsessivo Compulsivo.

**79**

**Em relação à anamnese psiquiátrica, assinale a alternativa correta.**

- (A) Situação conjugal, escolaridade e religião não fazem parte da identificação.
- (B) Rede de apoio social é um aspecto psicossocial muito relevante.
- (C) Hábitos e estilo de vida não fazem parte da anamnese.
- (D) Antecedentes pessoais e familiares têm pouco valor na anamnese.
- (E) A anamnese sempre deve terminar com um diagnóstico formal.

**80****Assinale a alternativa correta a respeito do Transtorno Bipolar.**

- (A) O diagnóstico de Transtorno Bipolar Tipo I pode ser feito se houver pelo menos 2 episódios depressivos e 1 episódio maníaco.
- (B) O diagnóstico de Transtorno Bipolar Tipo II pode ser feito se houver pelo menos 1 episódio depressivo e 2 episódios hipomaníacos.
- (C) O risco de suicídio é semelhante ao da população geral.
- (D) Recuperação funcional deve ser uma meta importante do tratamento.
- (E) O diagnóstico diferencial de Transtorno Depressivo deve ser feito com marcadores biológicos e exames de imagem funcional.

## Instruções para Discursiva

---

### **A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:**

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria.
2. Atendimento ao tema proposto na questão.
3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão.
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

### **O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:**

- a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado;
- b) manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
- c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e) não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva ou entregá-la em branco;
- f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

O candidato disporá de, **no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas** para elaborar a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

## Discursiva

---

1

As diversas definições de determinantes sociais de saúde (DSS) expressam, com maior ou menor nível de detalhe, o conceito bastante generalizado de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas à sua situação de saúde. O modelo de Dahlgren e Whitehead inclui os DSS dispostos em diferentes camadas concêntricas, segundo seu nível de abrangência. Já as Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente. Os objetivos das RAS são melhorar a qualidade da atenção, a qualidade de vida das pessoas usuárias, os resultados sanitários do sistema de atenção à saúde, a eficiência na utilização dos recursos e a equidade em saúde.

Diante do exposto, explique:

- a) com base no modelo dos Determinantes Sociais de Saúde (DSS) de Dahlgren e Whitehead, que sustenta a atual política de atenção às pessoas com condições crônicas no SUS, como os determinantes individuais e proximais são considerados nesse modelo;
- b) os três elementos fundamentais constitutivos das Redes de Atenção à Saúde.

1  
-----  
2  
-----  
3  
-----  
4  
-----  
5  
-----  
6  
-----  
7  
-----  
8  
-----  
9  
-----  
10  
-----  
11  
-----  
12  
-----  
13  
-----  
14  
-----  
15  
-----  
16  
-----  
17  
-----  
18  
-----  
19  
-----  
20  
-----  
21  
-----  
22  
-----  
23  
-----  
24  
-----  
25  
-----

26  
-----  
27  
-----  
28  
-----  
29  
-----  
30  
-----

